

标本则略有不同。故我们把前者鉴定为新疆贝母,而把后者鉴定为本种。它与新疆贝母的主要区别是:本种除最下部一对叶先端为略弯曲(不卷曲)外,其余的叶先端明显卷曲;花较小,长约3厘米,外面淡绿色,内面具紫色小方格,蜜腺窝稍凸出,但不成直角状。这些区别有时也有过渡。由于这个种所采到的标本很少,能否成立尚有疑问,这里暂予保留,以待今后进一步的采集与研究。花期6月。

产新疆西部(乌恰)。生于山坡阴处。分布于苏联吉尔吉斯的费尔干地区。

### 5. 阿尔泰贝母

*Fritillaria meleagris* L., Sp. Pl. ed. 1, 436. 1753; A. Los. in Fl. URSS 4: 306. 1935; Krause in Engl. et Prantl, Natürlich Pflanzenfam., Aufl. 2, 15a: 333—334, f. 131, d—f. 1930.

叶对生或上部互生,先端不卷曲。花单生,具1—3枚叶状苞片;花紫红色,有明显的浅色小方格;柱头裂片较长,约占花柱全长的1/3。蒴果棱上有宽翅。花期5月。

产新疆北部阿尔泰山。生于灌丛下或草坡上。分布于欧洲、高加索至阿尔泰。

本种采到的标本只有一份,而且不全,故鉴定上可能不准确。现暂收于此,以待今后进一步的采集与研究。上面描述系根据原记载作出的。

### 6. 平贝母

*Fritillaria ussuriensis* Maxim. in Trautv., Regel, Maxim. et Winkl., Dec. Pl. Nov. 9. 1882; 刘慎谔等,东北植物检索表 574,图版216,图4. 1959; 中药志 1: 220,图150. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 463,图7755. 1976.

植株长可达1米。鳞茎由2枚鳞片组成,直径1—1.5厘米,周围还常有少数小鳞茎,容易脱落。叶轮生或对生,在中上部常兼有少数散生的,条形至披针形,长7—14厘米,宽3—6.5毫米,先端不卷曲或稍卷曲。花1—3朵,紫色而具黄色小方格,顶端的花具4—6枚叶状苞片,苞片先端强烈卷曲;外花被片长约3.5厘米,宽约1.5厘米,比内花被片稍长而宽;蜜腺窝在背面明显凸出;雄蕊长约为花被片的3/5,花药近基着,花丝具小乳突,上部更多;花柱也有乳突,柱头裂片长约5毫米。花期5—6月。

产辽宁、吉林、黑龙江。生于低海拔地区的林下、草甸或河谷。也分布于苏联远东地区。

本种有悠久的栽培历史,是药材“平贝”的唯一来源。在吉林的抚松、通化、临江等地有栽培,北京昌平也开始栽培。关于栽培方法可参考抚松医药公司1973年编的《贝母栽培方法》。

本种花柱有乳突,叶较多轮,顶端的花具4—6枚叶状苞片,很容易区别于国产其他种类。

### 7. 川贝母 卷叶贝母 图版26: 1

*Fritillaria cirrhosa* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 51. 1825; 四川中药志 1: 47,图27. 1960; 西藏常用中草药 68,彩图45. 1973; 中国高等植物图鉴 5: 463,图