

在过去一些药书上曾有松贝 *F. sungbei* Hsiao et K. C. Hsia 的名称, 即为本种之裸名。因松贝为药材名称, 有多种来源, 故改用本名。

12. 湖北贝母 窑贝, 板贝 图版 27: 2—3

*Fritillaria hupehensis* Hsiao et K. C. Hsia, 植物分类学报 15(2): 40, 图 4, 1. 1977.

植株长 26—50 厘米。鳞茎由 2 枚鳞片组成, 直径 1.5—3 厘米。叶 3—7 枚轮生, 中间常兼有对生或散生的, 矩圆状披针形, 长 7—13 厘米, 宽 1—3 厘米, 先端不卷曲或多少弯曲。花 1—4 朵, 紫色, 有黄色小方格; 叶状苞片通常 3 枚, 极少为 4 枚, 多花时顶端的花具 3 枚苞片, 下面的具 1—2 枚苞片, 先端卷曲; 花梗长 1—2 厘米; 花被片长 4.2—4.5 厘米, 宽 1.5—1.8 厘米, 外花被片稍狭些; 蜜腺窝在背面稍凸出; 雄蕊长约为花被片的一半, 花药近基着, 花丝常稍具小乳突; 柱头裂片长 2—3 毫米。蒴果长 2—2.5 厘米, 宽 2.5—3 厘米, 棱上的翅宽 4—7 毫米。花期 4 月, 果期 5—6 月。

产湖北(西南部)、四川(东部)和湖南(西北部)。在湖北建始、宣恩一带有栽培。

本种与天目贝母 *F. monantha* Migo 很近, 区别点在于本种叶状苞片先端卷曲, 花梗长 1—2 厘米, 叶通常 3—7 枚轮生。

13. 天目贝母

*Fritillaria monantha* Migo in Journ. Shanghai Sci. Inst. Sect. 3, 4: 139. 1939; 陈心启、夏光成, 植物分类学报 15(2): 41. 1977.

植株长 45—60 厘米。鳞茎由 2 枚鳞片组成, 直径约 2 厘米。叶通常对生, 有时兼有散生或 3 叶轮生的, 矩圆状披针形至披针形, 长 10—12 厘米, 宽 1.5—2.8(—4.5) 厘米, 先端不卷曲。花单朵, 淡紫色, 具黄色小方格, 有 3—5 枚先端不卷曲的叶状苞片; 花梗长 3.5 厘米以上; 花被片长 4.5—5 厘米, 宽约 1.5 厘米; 蜜腺窝在背面明显凸出; 雄蕊长约为花被片的一半, 花药近基着, 花丝无小乳突; 柱头裂片长 3.5—5 毫米。蒴果长宽各约 3 厘米, 棱上的翅宽 6—8 毫米。花期 4 月, 果期 6 月。

产浙江北部(西天目山)和河南东南部(商城)。生于海拔 700—1200 米的林下、水边或潮湿地上。

14. 黄花贝母 图版 28: 1

*Fritillaria verticillata* Willd., Sp. Pl. 2: 91. 1799; 陈心启、夏光成, 植物分类学报 15(2): 41. 1977.

植株长 40—50 厘米。鳞茎由 2 枚鳞片组成, 直径约 2 厘米。叶在最下面的对生, 较宽而短, 其余的每 3—7 枚轮生, 条状披针形, 长 5—9 厘米, 宽 2—6 毫米, 通常先端强烈卷曲。花 1—5 朵, 淡黄色, 顶端的具 3 枚叶状苞片, 下面的具 2 枚叶状苞片; 苞片先端强烈卷曲; 花被片长 2—3 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 内三片稍宽于外三片, 蜜腺窝在背面明显凸出; 雄蕊长约为花被片的一半; 花药近基着, 花丝无小乳突; 柱头裂片长约 2 毫米。蒴果长