

本变种与野百合的区别在于叶倒披针形至倒卵形。

产于河北、山西、河南、陕西、湖北、湖南、江西、安徽和浙江。生于山坡草丛中、疏林下、山沟旁、地边或村旁，也有栽培，海拔300—920米。鲜花含芳香油，可作香料；鳞茎含丰富淀粉，是一种名贵食品，亦作药用，有润肺止咳、清热、安神和利尿等功效。

2. 岷江百合 图版 32: 5—6

Lilium regale Wilson in Horticulture 16: 110. 1912, in nota; et Wilson, Lil. East. As. 37, t. 5. 1925.——*L. myriophyllum* Wilson in Flora et Silva 3: 330, t. 1. 1905.

鳞茎宽卵圆形，高约5厘米，直径3.5厘米；鳞片披针形，长4—5厘米，宽1—1.5厘米。茎高约50厘米，有小乳头状突起。叶散生，多数，狭条形，长6—8厘米，宽2—3毫米，具1条脉，边缘和下面中脉具乳头状突起。花1至数朵，开放时很香，喇叭形，白色，喉部为黄色；外轮花被片披针形，长9—11厘米，宽1.5—2厘米；内轮花被片倒卵形，先端急尖，下部渐狭，蜜腺两边无乳头状突起；花丝长6—7.5厘米，几无乳头状突起，花药椭圆形，长0.9—1.2厘米，宽约3毫米；子房圆柱形，长约2.2厘米，宽约3毫米；花柱长6厘米，柱头膨大，宽6毫米。花期6—7月。

产四川。生山坡岩石边上、河旁，海拔800—2500米。

3. 台湾百合 图 10

Lilium formosanum Wallace in Garden 40: 442. 1891; Stapf in Bot. Mag. t. 9205. 1930; Woodc. et Stearn, Lil. world 219, f. 47. 1950.——*L. formosanum* var. *pricei* Staker in Lily year Book 4: 16. 1935; Woodc. et Stearn, Lil. world 219, f. 46. 1950.

鳞茎近球形，高2—3厘米，直径2—4厘米；鳞片矩圆状披针形至披针状卵形，白色或带黄色。茎高20—55厘米，有的带紫红色，有的有小乳头状突起。叶散生，条形至窄披针形，长10—12厘米，宽4—7毫米，全缘，两面无毛。花1—2朵，有时3—10朵排成近伞形，有香气，平展，喇叭形，筒部细，向上逐渐





图10 台湾百合 *Lilium formosanum* Wallace
(张泰利绘)

扩大，白色，外面带紫红色；花被片先端反卷，长11.5—14.5厘米；外轮花被片倒披针形，宽约2.2厘米；内轮花被片匙形，宽达3厘米，蜜腺槽绿色，无乳头状突起，少有具不明显



1—4. 宜昌百合 *Lilium leucanthum* Baker: 1. 植株上部, 2. 叶, 3. 苞片, 4. 雄蕊和雌蕊: 5—6. 岷江百合 *L. regale* Wilson: 5. 植株上部, 6. 叶. (刘春荣绘)