

的乳头状突起；花丝长约 10 厘米，扁平，近基部有细小突起，花药矩圆形，长约 1 厘米；子房圆柱形，长约 5 厘米，粗 4 毫米；花柱长 6.5 厘米，无毛，柱头膨大，3 裂。蒴果直立，圆柱形，长 7—9 厘米，宽 2 厘米。花期据 Wilson 记载，在低海拔地区每月开花，在 2000—3300 米地区 7—8 月开花。

产我国台湾。生于海拔 3500 米以下的向阳草坡。

4. 麝香百合

Lilium longiflorum Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2: 333. 1794.——*L. longiflorum* var. *scabrum* Masumune in Trans. Nat. Soc. Form. 26: 218. 1936.

鳞茎球形或近球形，高 2.5—5 厘米；鳞片白色。茎高 45—90 厘米，绿色，基部为淡红色。叶散生，披针形或矩圆状披针形，长 8—15 厘米，宽 1—1.8 厘米，先端渐尖，全缘，两面无毛。花单生或 2—3 朵；花梗长 3 厘米；苞片披针形至卵状披针形，长约 8 厘米，宽 1—1.4 厘米；花喇叭形，白色，筒外略带绿色，长达 19 厘米；外轮花被片上端宽 2.5—4 厘米；内轮花被片较外轮稍宽，蜜腺两边无乳头状突起。花丝长 15 厘米，无毛；子房圆柱形，长 4 厘米，柱头 3 裂。蒴果矩圆形，长 5—7 厘米。花期 6—7 月，果期 8—9 月。

产我国台湾。分布于日本(琉球群岛)。为一美丽的花卉，花极香，含有芳香油，可作香料。

5. 宜昌百合 图版 32: 1—4

Lilium leucanthum (Baker) Baker in Roy. Hort. Soc. 26: 337. 1901, pro parte (excl. Bot. Mag. t. 7722. 1900).——*L. brownii* var. *leucanthum* Baker in Gard. Chron. ser. 3, 16: 180. 1894.


鳞茎近球形，高 3.5—4 厘米，直径约 3 厘米；鳞片披针形，长 3.5 厘米，宽约 1 厘米，干时褐黄色或紫色。茎高 60—150 厘米，有小乳头状突起。叶散生，披针形，长 8—17 厘米，宽 6—10 毫米，边缘无乳头状突起，上部叶腋间无珠芽。花单生或 2—4 朵；苞片矩圆状披针形，长 (4—)5—6 厘米，稍宽于叶，宽 1.2—1.6 厘米；花梗长可达 6 厘米，紫色；花喇叭形，有微香，白色，里面淡黄色，背脊及近脊处淡绿黄色，长 12—15 厘米；外轮花被片披针形，宽 1.6—2.8 厘米；内轮花被片匙形，宽 2.6—3.8 厘米，先端钝圆，蜜腺无乳头状突起；花丝长 10—12 厘米，下部密被毛，花药椭圆形，长约 1 厘米；子房圆柱形，长 2.6—4.5 厘米，宽 4—5 毫米，淡黄色；花柱长可达 10 厘米，基部有毛；柱头膨大，径 8 毫米，3 裂。花期 6—7 月。

产湖北和四川。生山沟、河边草丛中，海拔 450—1500 米。

紫脊百合(变种)

var. *centifolium* (Stapf) Stearn in Woodc. et Coutts, Lil. 213. 1935 (June), apud Sealy in Gard. Chron. ser. 3, 98: 144. 1935 (Aug.).——*L. centifolium* Stapf apud Elwes in Gard. Chron. ser. 3, 70: 101. 1921.

本变种与宜昌百合的区别在于花被片外面为紫色或带褐色。花期 6—7 月。



1—4. 宜昌百合 *Lilium leucanthum* Baker: 1. 植株上部, 2. 叶, 3. 苞片, 4. 雄蕊和雌蕊: 5—6. 岷江百合 *L. regale* Wilson: 5. 植株上部, 6. 叶. (刘春荣绘)