

产甘肃(舟曲)。生于山沟中,海拔 2500 米。

6. 淡黄花百合 图版 33: 1—4

*Lilium sulphureum* Baker apud Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 351. 1892 (Jul.); Baker in Bot. Mag. t. 7257. 1892 (Oct.).——*L. myriophyllum* Franch. in Journ. de Bot. 6: 313. 1892 (Jul.).

鳞茎球形,高 3—5 厘米,直径 5.5 厘米;鳞片卵状披针形或披针形,长 2.5—5 厘米,宽 0.8—1.6 厘米。茎高 80—120 厘米,有小乳头状突起。叶散生,披针形,长 7—13 厘米,宽 1.3—1.8(—3.2) 厘米,上部叶腋间具珠芽。苞片卵状披针形或椭圆形;花梗长 4.5—6.5 厘米;花通常 2 朵,喇叭形,有香味,白色;花被片长 17—19 厘米;外轮花被片矩圆状倒披针形,宽 1.8—2.2 厘米;内轮花被片匙形,宽 3.2—4 厘米,蜜腺两边无乳头状突起;花丝长 13—15 厘米,无毛或少有稀疏的毛;花药长矩圆形,长约 2 厘米;子房圆柱形,长 4—4.5 厘米,宽 2—5 毫米,紫色;花柱长 11—12 厘米,柱头膨大,径约 1 厘米。花期 6—7 月。

产云南、贵州、四川和广西。生路边、草坡或山坡阴处疏林下,海拔 90—1890 米。鳞茎可入药。

本种与通江百合 *L. sargentiae* Wilson 很相近,其不同点在于本种花丝无毛,花稍大,花被片长 17—19 厘米。


7. 通江百合 图版 33: 5—6

*Lilium sargentiae* Wilson in Gard. Chron. ser. 3, 51: 385. 1912; et in Horticulture 18: 169. 1913; Woodc. et Stearn, Lil. world 331, f. 104. 1950.——*L. formosum* Franch. in Journ. de Bot. 6: 317. 1892.

鳞茎近球形或宽卵圆形,高 4—4.5 厘米,直径 5—6 厘米;鳞片披针形,长 3.5—4 厘米,宽 1.5—1.7 厘米。茎高 45—160 厘米,有小乳头状突起。叶散生,披针形或矩圆状披针形,长 5.5—12 厘米,宽 1—3 厘米,上部叶腋间有珠芽。苞片卵状披针形,长 5—6 厘米,宽 1.2—2 厘米;花梗长 5.5—8.5 厘米;花 1—4 朵,喇叭形,白色,基部淡绿色,先端稍反卷;外轮花被片倒披针形,长 14—16(—17) 厘米,宽 2—2.8 厘米;内轮花被片比外轮花被片宽,狭倒卵状匙形,蜜腺黄绿色,无乳头状突起;花丝长 11—13 厘米,下部密被毛;花药矩圆形,长 1.4—2 厘米,花粉褐黄色;子房圆柱形,长 3.5—4.5 厘米,径 3—5 毫米,紫色;花柱长 10—11 厘米,上端稍弯,柱头膨大,径 8—10 毫米,3 裂。蒴果矩圆形,长 6—7 厘米,宽约 3.5 厘米。花期 7—8 月,果期 10 月。

产四川。生山坡草丛中,灌木林旁,海拔 500—2000 米。

本种与淡黄花百合 *L. sulphureum* Baker 很相似,不同点在于本种花丝下部密被毛,花被片长 14—17 厘米。



1—4. 淡黄花百合 *Lilium sulphureum* Baker: 1. 植株上部; 2. 外花被片, 3. 内花被片, 4. 雄蕊和雌蕊; 5—6. 遼江百合 *L. sargentiae* Wilson: 5. 叶和珠芽, 6. 内花被片和雄蕊。(刘春荣绘)