

匙形，长6.5—8厘米，宽1.1—2.3厘米，先端近圆形，蜜腺两边无乳头状突起；花丝钻状，长约3厘米，无毛，花药长1.6厘米，橙黄色；子房圆柱形，长1.7—2厘米，宽2—4毫米；花柱长2.2—2.6厘米，柱头近球形，径2.5—5毫米，3裂。蒴果矩圆形，长约3.5厘米，宽约2.5厘米。花期7月。

产云南(西北部)和四川(西部)。生林缘，海拔2800米。缅甸北部也有分布。

金黄花滇百合(变种)

var. *aureum* Grove et Cotton in Lily Year Book 8: 127. 1939.

本变种与滇百合的区别在于花为淡黄色，内具紫色斑点。

产云南(西北部)和四川(西南部)。生林下草坡或灌丛边缘，海拔2000—2420米。

黄绿花滇百合(变种)

var. *delavayi* (Franch.) Wilson, Lil. East. As. 43. 1925. — *Lilium delavayi* Franch. in Journ. de Bot. 6: 314. 1892.

本变种与滇百合的区别在于花黄绿色或橄榄绿至淡绿色，内具红紫色或鲜红色斑点。

产云南、四川和贵州。生山坡林中或草坡，海拔2500—3800米。

紫红花滇百合(变种)

var. *rubrum* Stearn in Gard. Chron. ser. 3, 124: 4. 1948.

本变种与滇百合的区别在于花红色或粉红色，有紫红色或红色斑点。

产云南。生杂木林缘、溪边或山坡草地，海拔1500—2000米。

无斑滇百合(变种)

var. *yunnanense* (Franch.) Sealy ex Woodc. et Stearn, Lil. world 151. 1950. — *Lilium yunnanense* Franch. in Journ. de Bot. 6: 314. 1892.

本变种与滇百合的区别在于花白色或淡玫瑰色，无斑点；叶缘有小乳头状突起，两面无白色柔毛。

产云南(西北部)和四川(西南部)。生松林下或草地上，海拔2000—2800米。

16. 蒜头百合 图版37: 5—8

Lilium sempervivoideum Lévl. in Bull. Géogr. Bot. 25: 38. 1915; et Cat. Pl. Yunnan. 166, f. 39. 1917.

鳞茎近球形，高2.5—3厘米，直径2.5—3厘米；鳞片披针形，长2.5—3厘米，宽0.5—1厘米。茎高20—30厘米，有小乳头状突起。叶16—30枚散生于茎中部，条形，长2.5—5.5厘米，宽2—4毫米，1脉，全缘。花单生，钟形，白色，基部具微小的紫红色斑点；外轮花被片披针形，长3.5—4厘米，宽5—10毫米；内轮花被片较宽，狭椭圆状披针形，宽1.2—1.5厘米，蜜腺两边无乳头状突起；雄蕊向中心靠拢；花丝长1.2—1.5厘米，无毛，花药长矩圆形，长5.5—6.5毫米；子房紫黑色，长约8毫米，宽1.5—2.5毫米；花柱长1.5厘米，柱头膨大，径3—4毫米，3裂。花期6月。

产云南和四川。生山坡草地，海拔2400—2600米。

17. 玫红百合 图版37: 1—4

Lilium amoenum Wilson ex Sealy in Bot. Mag. t. 93. 1949.

鳞茎卵形，高2—2.5厘米，直径2—2.2厘米；鳞片披针形，高1.5—1.8厘米，宽6—8毫米，白色。茎高15—30厘米，有小乳头状突起。叶散生，8—12枚，长椭圆形或狭矩圆形，长2.8—4.5厘米，宽2—7毫米，无毛，全缘，中脉明显。花1朵，有香味，钟形，紫红色或紫玫瑰色，有红色斑点，下垂；外轮花被片披针形，长3—4厘米，宽9—10毫米，先端稍反卷；内轮花被片卵状披针形或椭圆形，宽1.4—1.5厘米，基部渐狭，先端渐尖或钝，蜜腺绿色；雄蕊向中心靠拢；花丝长1.4厘米，无毛，花药长5—6.5毫米；子房圆柱形，长8毫米，宽2毫米；花柱长1.2—1.6厘米，柱头膨大，径3毫米，3裂。花期6月。

产云南。生林下，海拔2100—2300米。

组3. 卷瓣组——Sect. *Sinomartagon* Comber

18. 紫斑百合

Lilium nepalense D. Don in Mem. Wern. Soc. 3: 412. 1821.

鳞茎近球形，高约2.5厘米，直径约2厘米，鳞片披针形或卵状披针形，长2—2.5厘米，宽1—1.2厘米。茎高40—120厘米，有小乳头状突起。叶散生，披针形或矩圆状披针形，长5—10厘米，宽2—3厘米，先端渐尖，基部渐狭，边缘有小乳头状突起，具5条脉，两面无毛。花单生或3—5朵排列成总状花序；苞片矩圆状披针形，长5.5—10厘米；花梗长9—13厘米；花淡黄色或绿黄色，喉部带紫色，花稍呈喇叭形，花被片反卷，长6—9厘米，宽1.6—1.8厘米，蜜腺两边无乳头状突起；花丝长5—5.5厘米，无毛，花药长8—9毫米；子房圆柱形，长1.5—1.8厘米，花柱长4—5厘米，柱头膨大，径约4毫米。花期6—7月。

产西藏南部(吉隆、聂拉木)和云南(西部)。生杂木林下灌丛中，路边。海拔2650—2900米。尼泊尔和印度有分布。

窄叶百合(变种) 图版38: 1—4

var. *burmanicum* W. W. Sm. in Trans. Bot. Soc. Edinb. 28: 135. 1922.


本变种与紫斑百合不同在于叶长而窄，长9—16厘米，宽0.8—1.4厘米。

产云南。生山坡草丛中或林缘，海拔1200—2200米。缅甸和泰国也有分布。

披针叶百合(变种) 图版38: 5—8

var. *ochraceum* (Franch.) Liang, comb. nov. — *Lilium ochraceum* Franch. in Journ. de Bot. 6: 319. 1892.

本变种与紫斑百合不同在于叶较短而窄，长3—5.5厘米，宽8—10毫米；苞片卵形，先端尖，长3.5厘米，宽1.1厘米。花期7—8月，果期10—11月。



1—4. 玫红百合 *Lilium amoenum* Wilson ex Sealy; 1—2. 植株, 3. 外花被片, 4. 内花被片; 5—8. 蒜头百合 *L. sempervivoideum* Lévl.: 5—6. 植株, 7. 外花被片, 8. 内花被片。(刘春荣绘)