

(Pl. David. 2: 128) 1887; et in Journ. de Bot. 6: 316. 1892; Woodc. et Stearn, Lil. world 212. f. 43. 1950.—*L. lankongense* Franch. in Journ. de Bot. 6: 317. 1892.—*L. forrestii* W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinb. 8: 192. 1914.—*L. farreri* Turrill in Gard. Chron. ser. 3, 66: 76. 1919; et in Bot. Mag. t. 8847. 1920.

鳞茎卵圆形,高1.5—3厘米,宽1.5—4厘米,具走茎;鳞片卵形至宽披针形,长1—2厘米,宽0.5—1.8厘米,白色。茎高50—85厘米,有淡紫色条纹。叶散生,披针形至矩圆状披针形,长4.5—5厘米,宽约1厘米,两面无毛,具3—5脉,有的边缘有乳头状突起。花单生或数朵排成总状花序或近伞房花序、伞形总状花序;苞片叶状,披针形,长2.5—4厘米,宽4—6毫米;花梗长10—22厘米;花下垂,有香味,白色或粉红色,有紫色斑点;花被片反卷,长4.5—6厘米,宽1.2—1.4厘米,蜜腺两边有乳头状突起;花丝长3.5厘米,无毛,花药窄矩圆形,长约1厘米,黄色;子房圆柱形,长1.2厘米,宽1.5—3毫米;花柱长为子房的2倍或更长,柱头膨大。蒴果椭圆形,长2.5—3厘米,宽约2.2厘米。种子扁平,具1—2毫米宽的翅。花期7月,果期9月。

产四川、云南、西藏和甘肃。生于高山草地、林缘或灌木丛中,海拔2300—3500米。

据 Wilson、Woodcock 和 Stearn 等人的记载, *L. lankongense* Franch. 与本种有区别,它具有总状花序,叶很集中,叶脉在背面凸出,花被片粉红色,种子翅较窄(约1毫米)等特征。但从中国科学院植物所收藏的标本看,花序的变化很大,从单花至总状或近伞形都有,有的表面上似伞形,但花梗长短不一,有的花梗中部有1枚叶状苞片,实际上还是总状花序;其他如叶的集中与否,脉在叶背的凸出情况以及花的色泽,都有变化、过渡和交叉,只有种子的翅有宽窄的区别,但也有交叉。因此,我们将 *L. lankongense* Franch. 归并入本种。

与本种相近的尚有一种双苞百合 *L. ninae* Vrishcz (1968),产于我国西藏。其不同点在于叶条形,苞片通常一对,不具走茎。目前尚未见到标本,难于判断。

26. 柠檬色百合

Lilium leichtlinii Hook. f. in Bot. Mag. t. 5673. 1867.

产日本,中国不产。

大花卷丹(变种) 山丹花

var. *maximowiczii* (Regel) Baker in Gard. Chron. 1422. 1871; Wilsen, Lil. East. As. 71, t. 11. 1925—*L. maximowiczii* Regel in Gartenfl. 17: 322, t. 596. 1868.

鳞茎球形,高4厘米,宽4厘米,白色。茎高0.5—2米,有紫色斑点,具小乳头状突起。叶散生,窄披针形,长3—10厘米,宽0.6—1.2厘米,边缘有小乳头状突起,上部叶腋间不具珠芽。花2—3朵至8朵排列成总状花序,少有单花;苞片叶状,披针形,长5—7.5