

片狭椭圆状披针形,长2.2—4.5厘米,宽1.2—1.5厘米,全缘,基部有3—8个紫褐色的斑点;内轮花被片卵形至宽卵形,长2.2—4.3厘米,宽1.3—1.6厘米,先端急尖,基部约有几个至十几个紫红色的斑点;花丝钻形,长约1厘米;子房长5—7毫米,径2—2.5厘米;花柱向上逐渐膨大,长约为子房的2倍,长1—1.2厘米,柱头头状,3浅裂。蒴果矩圆形,长约1厘米,宽约1.2厘米,淡褐色。花期6—7月,果期9—10月。

产云南(西北部)。生山坡杂木林内或草坡上,海拔3000米。

本种与碟花百合 *L. saluenense* (Balf. f.) Liang 很相近,其不同点在于本种花柱长约为子房的2倍,花被片里面基部约有几个至十几个紫色斑点。

36. 碟花百合 云南豹子花 图版44: 7—12

Lilium saluenense (Balf. f.) Liang, comb. nov. — *Nomocharis saluenensis* Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinb. 27: 294. 1915; Stapf in Bot. Mag. t. 9296. 1933.

鳞茎卵形,高2—4厘米,直径2—2.5厘米,白色。茎高30—90厘米,无毛。叶散生,披针形,长3.5—7厘米,宽0.8—1.5厘米。花1至7朵,张开,似碟形,粉红色,里面基部具紫色的细点;外轮花被片椭圆形至窄椭圆形,长3.5—5.2厘米,宽1.6—2厘米,先端急

尖,全缘;内轮花被片与外轮的相似,长3—4.5厘米,宽1.7—2厘米,先端急尖,基部具明显的细点,全缘;花丝钻形,长约1厘米,花药长3—4毫米;子房长6—7毫米,径2.5—3毫米;花柱短于子房,长2.5—4毫米,向上渐膨大,柱头头状,3浅裂。蒴果矩圆形,长1.7—1.8厘米,宽约1.8厘米,紫绿色至褐色。花期6—8月,果期8—9月。

产云南(西北部)、四川和西藏(东南部)。生山坡丛林中、林缘或草坡上,海拔2800—4500米。缅甸也有分布。

组4. 轮叶组——Sect. *Martagon*
Rechb.

37. 青岛百合 图16

Lilium tsingtauense Gilg in Bot. Jahrb. 34, Beibl. 75: 24. 1904; Woodc.




图16 青岛百合 *Lilium tsingtauense* Gilg
(张泰利绘)

et Stearn, Lil. world 359, f. 114. 1950.

鳞茎近球形,高2.5—4厘米,直径2.5—4厘米;鳞片披针形,长2—2.5厘米,宽6—8



1—6. 开瓣百合 *Lilium apertum* Franch.: 1—2. 植株, 3. 外花被片, 4. 内花被片, 5. 雄蕊, 6. 雌蕊; 7—12. 禄花百合 *L. saluenense* (Balf. f.) Liang: 7. 鳞茎, 8. 植株中、上部, 9. 外花被片, 10. 内花被片, 11. 雄蕊, 12. 雌蕊。(刘春荣绘)