

产云南(西北部)。生高山矮竹林下或高山草地上,海拔 3928—4255 米。缅甸也有分布。

3. 豹子花 图版 45: 7—12

Nomocharis pardanthina Franch. in Journ. de Bot. 3: 113, t. 3. 1889.

鳞茎卵状球形,高 2.5—3 厘米,直径 2.3—2.5 厘米,干时褐色,外层带黄色。茎高 25—90 厘米,无毛。叶在同一植株上兼具散生与轮生的,狭椭圆形或披针状椭圆形,长 2.5—4.5 厘米,宽 0.7—1.5 厘米。花单生,少数朵,红色或粉红色;外轮花被片卵形,长 2.5—3 厘米,宽 1.2—1.5 厘米,几无斑点,全缘;内轮花被片宽卵形至卵圆形,长 2.5—3 厘米,宽 2—2.5 厘米,在里面有紫红色的斑点,基部有肉质的紫红色的垫状隆起,边缘有不整齐的锯齿;花丝下部呈肉质的圆筒状的膨大,紫红色或粉红色,长 5—7 毫米,上部丝状,白色,长 2—2.5 毫米;子房长 5—7 毫米,宽 2—4 毫米;花柱向上渐粗,长约 8 毫米,柱头头状,3 浅裂。蒴果矩圆形,长 2.5 厘米,宽 1.7 厘米。花期 5—6 月,果期 7 月。

产云南西北部。生草坡上,海拔 3000—3500 米。

滇西豹子花(变种)

var. *farrei* W. E. Evans in Notes Bot. Gard. Edinb. 15: 20. 1925.

本变种与豹子花的区别在于它的叶狭长,全为狭披针形,长 5—9 厘米,宽 0.6—0.8 (—1) 厘米。

产云南(西部)。生山坡草丛中,海拔 2800 米。缅甸也有分布。

4. 宽瓣豹子花 图版 46: 1—6

Nomocharis mairei Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde 12: 287. 1913.

鳞茎近卵形,高 2.5—3.5 厘米,直径 2—3.5 厘米,白色,干时淡褐色。茎高 25—65 厘米,有小乳头突起。叶轮生,每轮 4—8 枚,披针形,长 5—7 厘米,宽 1—1.4 厘米,上面深绿色,下面淡绿色,先端渐尖,两面无毛。花 1 至数朵,下垂,粉红色;外轮花被片卵形,长 2.5—3.5 厘米,宽 1.5—2 厘米,先端渐尖,全缘;内轮花被片宽卵形至近圆形,长 2—3 厘米,宽 2—3 厘米,边缘流苏状,密布紫红色斑点,向上斑点逐渐扩大成斑块,先端急尖,基部具紫红色的肉质的鸡冠状的垫状隆起;花丝下部呈肉质的圆筒状的膨大,长 6.5—7 毫米,上部丝状,长 2 毫米,黄白色;子房长 6—8 毫米,宽 2—3 毫米;花柱向上渐粗,长 6—8 毫米,柱头头状,3 浅裂。蒴果矩圆状卵形,长 2.5 厘米,宽 2.5 厘米,具 6 钝棱,淡褐色。花期 5—7 月,果期 7—8 月。

产云南(西北部)和四川。生山坡林缘或草坡上,海拔 2700—4050 米。

本种与多斑豹子花 *N. meleagrina* Franch. 很相似,不同点在于内轮花被片近圆形,长等于宽。

5. 多斑豹子花 图版 46: 7—12

Nomocharis meleagrina Franch. in Journ. de Bot. 12: 176. 1898.



1—6.宽瓣豹子花 *Nomocharis mairei* Lévl.: 1—2.植株, 3.外花被片, 4.内花被片, 5.雄蕊, 6.雌蕊; 7—12.多斑豹子花 *N. meleagrina* Franch.: 7.鳞茎, 8.植株中、上部, 9.外花被片, 10.内花被片, 11.雄蕊, 12.雌蕊。(刘春荣绘)