

14. 穗花韭族——Miluleae

只有1属,特征见属的记载。

31. 穗花韭属——*Milula* Prain

Prain in Sc. Mem. Med. Off. Arm. Ind. 9: 25, t. 1. 1896;
Krause in Engl. et Prantl, Natürlich Pflanzenfam. aufl. 2,
15a: 329. 1930.

多年生草本;鳞茎狭长,外面包着许多纤维状残存的鞘,下面常有粗短的根状茎。叶剑形,如韭菜,下部的叶鞘互相套迭,如葱白。花葶从叶丛中央抽出,具密穗状花序;花序基部有1枚总苞片,早期包着花序,后来向下反折;花小,通常花被片6,约在中部以下合生成钟状的筒;雄蕊6,外轮3枚花丝的下半部强烈扩大,两侧各有1枚小齿;内轮3枚花丝丝状,不扩大,无齿;花药近背着,内向纵裂;子房3室,每室具2枚胚珠;花柱细长,柱头小。蒴果三棱状球形,室背开裂,每室有1颗种子,很少2颗。

单种属。

1. 穗花韭 图24

Milula spicata Prain in Sc. Mem. Med. Off. Arm. Ind. 9: 25, t. 1. 1896; Stearn in Bull. Brit. Mus. (Natural History) Bot. 2(6): 189. 1960; 中国高等植物图鉴 5: 465, 图 7759. 1976.

植株高5—25(—60)厘米,外形很象葱韭一类植物,也有葱蒜味,但具有狗尾草似的密穗状花序,可以很容易识别。花葶和叶近等长,叶宽1—4毫米。花淡紫色,花被长2.5—3.5毫米,钟状,在果期宿存;花被片合生的程度约占 $1/3$ — $2/3$,常有变化;雄蕊全长的 $1/3$ 明显伸出花被之外;外轮雄蕊的齿大小和形状有变化;花柱长2.5—4毫米,比子房长,伸出花被外。蒴果直径约3—4毫米。种子狭卵形,长约2—2.5毫米,黑色,上面有极小的细点。花果期8—10月。

产西藏南部(亚东、南木林、定结、仲巴、林周、米林、墨脱、加查、拉萨、日喀则、定日、普兰、曲松、朗县、浪卡子和措美)。生于含沙质的草地、山坡、灌丛中或松林下;海拔2900—4800米。分布于尼泊尔、锡金和印度。




图24 穗花韭 *Milula spicata* Prain
(王金凤绘)