

产西藏、云南、四川、青海、甘肃、陕西、河南和安徽。生于海拔2000—4900米的阴湿山坡、沟边、灌丛或林下。印度、尼泊尔、锡金和不丹也有分布。

本种在云南丽江、鹤庆和中甸一带在叶形和花色方面变化很大,有待进一步研究。

组2. 粗根组—Sect. *Bromatorrhiza* Ekberg

7. 宽叶韭 大叶韭 图31

Allium hookeri Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 339. 1864; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 341. 1892.—*A. tsoongii* Wang et Tang, 静生生物所汇报, Bot. Ser. 7: 292. 1937.




图31 宽叶韭 *Allium hookeri* Thwaites
(王金凤绘)

鳞茎圆柱状,具粗壮的根;鳞茎外皮白色,膜质,不破裂。叶条形至宽条形,稀为倒披针状条形,比花葶短或近等长,宽5—10(—28)毫米,具明显的中脉。花葶侧生,圆柱状,或略呈三棱柱状,高(10—)20—60厘米,下部被叶鞘;总苞2裂,常早落;伞形花序近球状,多花,花较密集;小花梗纤细,近等长,为花被片的2—3(—4)倍长,基部无小苞片;花白色,星芒状开展;花被片等长,披针形至条形,长4—7.5毫米,宽1—1.2毫米;先端渐尖或不等的2裂;花丝等长,比花被片短或近等长,在最基部合生并与花被片贴生;子房倒卵形,基部收狭成短柄,外壁平滑,每室1胚珠;花柱比子房长;柱头点状。花果期8—9月。

产四川、云南(西北部)和西藏(东南部)。生于海拔1500—4000米的湿润山坡或林下。斯里兰卡、不丹和印度的北部也有分布。在我国南方的一些地区栽培作蔬菜食用。

7a. 木里韭(变种)

var. *muliense* Airy-Shaw in Notes Bot. Gard. Edinb. 16: 139. 1931.

与宽叶韭的区别在于本变种的花葶比叶短,高3—15(—30)厘米;叶条形,宽2—5(—10)毫米;花淡绿黄色至淡黄色。花果期7—9月。

产四川(木里、稻城)和云南(丽江玉龙山、中甸)。生于海拔2800—4200米的草坡、湿地或林缘。

8. 三柱韭 图32

Allium humile Kunth var. *trifurcatum* Wang et Tang, var. nov. in