

18—57 厘米,中部粗 1—3.5 毫米,下部被叶鞘;总苞 2 裂,与伞形花序约等长,宿存;伞形花序球状,具多而极密集的花;小花梗近等长,比花被片短,基部无小苞片;花紫红色;花被片倒卵状矩圆形,基部 1.5—2 毫米彼此靠合成短管,内轮的先端钝,具不规则的小钝齿,连同靠合部分长 6.5—7.8 毫米,宽 2.3—3 毫米,外轮的先端钝圆,有时略凹陷,连同靠合部分长 5.5—7 毫米,宽 1.8—3 毫米,常比内轮的稍短;花丝等长,约为花被片长的 1.5 倍,基部 1.5—2 毫米合生并与花被片贴生,内轮花丝的分离部分基部扩大,扩大部分长 3.2—4.5 毫米,基部宽 1.6—3 毫米,每侧各具 1 齿或无齿,外轮花丝分离部分不扩大,锥形;子房倒卵状球形,基部无凹陷的蜜穴,每室 2 胚珠;花柱长 6—10 毫米,柱头点状。 花果期 9—10 月。

产云南西北部中甸、丽江一带。生于海拔 2800 米的山坡上。

本种与青甘韭 *A. przewalskianum* Regel 相似,但青甘韭的鳞茎外皮红色,明显的网状,小花梗比花被片长 2—3 倍,花被片分离,花丝仅基部合生,可以区别。

20. 白头韭 图 42

Allium leucocephalum Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 27 (2) 123. 1854. — *A. flavovirens* Regel in Act. Hort. Petrop. 10: 344, t. 8, f. 1. 1887.

鳞茎单生或 2 枚聚生,近圆柱状,长 4—10 厘米,粗 0.6—1.3 厘米;鳞茎外皮暗黄褐色,破裂成纤维状,呈网状。叶半圆柱状,中空,上面具沟槽,比花葶短,宽 (1—)2—5 毫

米,光滑。花葶圆柱状,高 20—50(—60) 厘米,粗 2—2.5 毫米,1/3 以下被光滑的叶鞘;总苞 2 裂,宿存;伞形花序球状,具多而密集的花;小花梗近等长,从略短于花被片直到比其长 1.5 倍,基部具小苞片;花白色,或稍带黄色;花被片具不明显的带绿色或淡紫色的中脉,长 3.5—6 毫米,宽 1.4—2.2 毫米,内轮的矩圆状椭圆形,外轮的矩圆状卵形,稍短,有时几乎比内轮的短 1/4;花丝等长,从略长于花被片直到比其长 1 倍,在基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大,每侧各具 1 齿,有时齿端又分裂为 2—4 个不规则小齿,外轮的锥形;子房倒卵状,腹缝线基部具凹陷的蜜穴;花柱伸出花被。 花果期 7—8 月。

产黑龙江、内蒙古和甘肃。生于沙地。苏联西伯利亚东部、蒙古也有分布。

Regel 在 1887 年根据我国甘肃的标本发表了

Allium flavovirens Regel (in Act. Hort. Petrop. 10: 334, t. 8, f. 1. 1887)。后来 Vvedensky 在《苏联植物志》中把该种并入 *A. leucocephalum* Turcz. 中。可是在




图 42 白头韭 *Allium leucocephalum* Turcz. (王金凤绘)

我国的甘肃标本中, 未曾发现这个种的标本。而从 Regel 发表该种时的描述和图来看, 与 *A. leucocephalum* Turcz. 有一定的出入。因现无标本, 故暂用 Vvedensky 的处理办法, 今后还需进一步研究。

在《东北植物检索表》569 页 (1959 年) 中提到的裂丝葱 *A. stenodon* Nakai et Kitag. var. *lobatum* Li et Fang (non. nud.), 从检索特征和图来看很可能就是白头韭。

21. 新疆韭 图 43

Allium flavidum Ledeb., Fl. Alt. 2: 7. 1830.

鳞茎单生或 2 枚聚生, 狭卵状圆柱形, 长 2—4 厘米, 粗 0.4—1 厘米; 鳞茎外皮灰褐色至黄褐色, 破裂成纤维状, 呈网状。叶条形, 比花葶短, 宽 2—5 (—7) 毫米。花葶圆柱状, 高 15—45 厘米, 1/3—




图 43 新疆韭 *Allium flavidum* Ledeb.
(王金凤绘)

1/2 被叶鞘; 总苞 2 裂, 宿存; 伞形花序球状, 稀半球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 常近等长于花被片, 很少比其长 2 倍, 基部具小苞片; 花白色至淡黄色; 花被片矩圆形至卵状矩圆形, 长 4—6 毫米, 宽 1.2—2 毫米, 内轮的比外轮的长 1/5—1/4; 花丝等长, 为花被片长的 1.2—1.5 倍, 基部合生并与花被片贴生, 内轮的基部扩大, 扩大部分近矩圆形, 高大于宽, 每侧各具 1 齿; 子房倒卵球状, 腹缝线基部具凹陷的蜜穴; 花柱远比子房长, 伸出花被外。花果期 7—8 月。

产新疆北部。生于向阳山坡和林下岩石缝。苏联中亚地区、西伯利亚西部以及蒙古西部也有分布。

22. 北韭 图 44

Allium lineare L., Sp. Pl. ed. 1, 295. 1753.

鳞茎单生或 2 枚聚生, 近圆柱状, 长 3—6 厘米, 粗 0.5—1.5 厘米; 鳞茎外皮黄褐色至




图 44 北韭 *Allium lineare* L. (王金凤绘)