

我国的甘肃标本中, 未曾发现这个种的标本。而从 Regel 发表该种时的描述和图来看, 与 *A. leucocephalum* Turcz. 有一定的出入。因现无标本, 故暂用 Vvedensky 的处理办法, 今后还需进一步研究。

在《东北植物检索表》569 页 (1959 年) 中提到的裂丝葱 *A. stenodon* Nakai et Kitag. var. *lobatum* Li et Fang (non. nud.), 从检索特征和图来看很可能就是白头韭。

21. 新疆韭 图 43

Allium flavidum Ledeb., Fl. Alt. 2: 7. 1830.

鳞茎单生或 2 枚聚生, 狭卵状圆柱形, 长 2—4 厘米, 粗 0.4—1 厘米; 鳞茎外皮灰褐色至黄褐色, 破裂成纤维状, 呈网状。叶条形, 比花葶短, 宽 2—5 (—7) 毫米。花葶圆柱状, 高 15—45 厘米, 1/3—




图 43 新疆韭 *Allium flavidum* Ledeb.
(王金凤绘)

1/2 被叶鞘; 总苞 2 裂, 宿存; 伞形花序球状, 稀半球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 常近等长于花被片, 很少比其长 2 倍, 基部具小苞片; 花白色至淡黄色; 花被片矩圆形至卵状矩圆形, 长 4—6 毫米, 宽 1.2—2 毫米, 内轮的比外轮的长 1/5—1/4; 花丝等长, 为花被片长的 1.2—1.5 倍, 基部合生并与花被片贴生, 内轮的基部扩大, 扩大部分近矩圆形, 高大于宽, 每侧各具 1 齿; 子房倒卵球状, 腹缝线基部具凹陷的蜜穴; 花柱远比子房长, 伸出花被外。花果期 7—8 月。

产新疆北部。生于向阳山坡和林下岩石缝。苏联中亚地区、西伯利亚西部以及蒙古西部也有分布。

22. 北韭 图 44

Allium lineare L., Sp. Pl. ed. 1, 295. 1753.

鳞茎单生或 2 枚聚生, 近圆柱状, 长 3—6 厘米, 粗 0.5—1.5 厘米; 鳞茎外皮黄褐色至




图 44 北韭 *Allium lineare* L. (王金凤绘)