

内轮花被片狭矩圆形至椭圆状矩圆形,先端近平截,常具不规则小齿,稍比外轮的长,长5—6.5毫米,宽1.5—3毫米;花丝略短于花被片,等长,基部合生并与花被片贴生,合生部分高0.6—1毫米,内轮的4/5扩大成卵状矩圆形,扩大部分每侧各具1钝齿,极稀无齿,外轮的锥形;子房卵球状,外壁具细的疣疱状突起或突起不明显,基部无凹陷的蜜穴;花柱略比子房长。花果期7—9月。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、内蒙古和新疆(东北部)。生于海拔600—2000米的向阳山坡或草原上。

32. 短齿韭

Allium dentigerum Prokh. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS 29: 563. 1930.

鳞茎丛生,圆柱状,基部略扩大,粗3—6毫米;鳞茎外皮灰白色,有时略带红色,纸质,条裂,有时顶端纤维状。叶半圆柱状,约为花葶的1/2长,宽0.5—1毫米。花葶圆柱状,高15—35厘米,下部被叶鞘;总苞2裂,宿存;伞形花序半球状至球状,具多而密集的花;小花梗近等长,比花被片长2—3倍,基部无小苞片;花紫红色;外轮花被片卵形,长3—3.5毫米,宽约1.8毫米,常比内轮的短,内轮的卵状矩圆形,先端钝圆,常有不规则小齿,长3.8—4.2毫米,宽1.8—2.2毫米;花丝等长,略短于或等长于花被片,稀略长于花被片,仅基部合生并与花被片贴生,内轮花丝的中下部扩大成宽卵形,扩大部分每侧各具1钝齿,稀无齿,外轮的锥形;花药黄色;子房倒卵球状,外壁具细的疣疱状突起;花柱略比子房长;柱头略增大。花期8月。

产甘肃和陕西(西北部)。生于海拔1500—2500米的山坡草地。

本种与砂韭 *A. bidentatum* Fisch. ex Prokh. 的外形极为相似,而砂韭的内轮花丝4/5扩大成卵状矩圆形,易与本种区别。

33. 蓝花韭 图51

Allium beesianum W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinb. 8: 176. 1914; Stapf in Bot. Mag. t. 9331. 1933.

鳞茎数枚聚生,圆柱状,粗0.5—1厘米;鳞茎外皮褐色,破裂成纤维状,基部近网状,有时条裂。叶条形,比花葶短,宽3—8毫米。花葶圆柱状,高(20—)30—50厘米,中部以




图51 蓝花韭 *Allium beesianum* W. W. Sm.
(王金凤绘)