

35. 高山韭 图 53

Allium sikkimense Baker in Journ. of Bot. 12: 292. 1874; C. H. Wright in Bot. Mag. t. 8858. 1920; Stearn in Bull. Brit. Mus. Bot. 2 (6): 178. 1960. — *A. kansuense* Regel in Act. Hort. Petrop. 10: 690. 1887. — *A. cyaneum* Regel var. *brachystemon* Regel, l. c., p. 346. — *A. tibeticum* Rendle in Journ. of Bot. 44: 41. 1906.

鳞茎数枚聚生，圆柱状，粗 0.3—0.5 厘米；鳞茎外皮暗褐色，破裂成纤维状，下部近网状，稀条状破裂。叶狭条形，扁平，比花茎短，宽 2—5 毫米。花茎圆柱状，高 15—40 厘米，有时矮到 5 厘米，下部被叶鞘；总苞单侧开裂，早落；伞形花序半球状，具多而密集的花；小花梗近等长，比花被片短或与其等长，基部无小苞片；花钟状，天蓝色；花被片卵形或卵状矩圆形，先端钝，长 6—10 毫米，宽 3—4.5 毫米，内轮的边缘常具 1 至数枚疏离的不规则小齿，且常比外轮的稍长而宽；花丝等长，为花被片长度的 $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ ，基部合生并与花被片贴生，合生部分高约 1 毫米，内轮的基部扩大，有时每侧各具 1 齿，外轮的基部也常扩大，有时每侧亦各具 1 齿；子房近球状，腹缝线基部具明显的有窄帘的凹陷蜜穴；花柱比子房短或近等长。 花果期 7—9 月。

产宁夏(南部)、陕西(西南部)、甘肃(南部)、青海(东部和南部)、四川(西北部至西南部)、西藏(东南部)和云南(西北部)。生于海拔 2400—5000 米的山坡、草地、林缘或灌丛下。印度、尼泊尔、不丹和锡金也有分布。

本种以条形、扁平的叶，天蓝色的花，花丝比花被片短，花被片卵形至卵状矩圆形，内轮边缘常具小齿而易被识别。本种与齿被韭 *A. yuanum* Wang et Tang 极为相似，又常混生在一起，其区别在于齿被韭的叶为背面成龙骨状隆起的条形，干后常扭卷，花被片先端渐尖，特别是叶的特征在野外极易掌握，能准确地把它与具扁平而条形叶的本种分别开。

36. 天蓝韭 图 54

Allium cyaneum Regel in Act. Hort. Petrop. 3: 174. 1875; Hubbard in Bot. Mag. t. 9483. 1937. — *A. hugonianum* Rendle in Journ. of Bot. 44: 43, t. 476 A. 1906 — *A. tui* Wang et Tang, 静生生物所汇报, Bot. Ser. 7: 295. 1937.




图 53 高山韭 *Allium sikkimense* Baker
(王金凤绘)