

长可达7厘米,宿存或早落;伞形花序多花,松散;小花梗近等长,比花被片长2—4倍,果期更长,基部无小苞片;花白色;花被片常具绿色中脉,长3—5毫米,宽1.5—2.5毫米,内轮的卵状矩圆形,先端平截或钝圆,外轮的卵形,舟状,稍短;花丝等长,为花被片长度的1.5—2倍,仅基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大,扩大部分每侧各具1齿片,齿片高1.5—2.5毫米,顶端具2至数枚不规则的小齿,外轮的锥形;子房倒卵状,腹缝线基部具有帘的凹陷蜜穴;花柱伸出花被外。 花果期8—9月。

产山西、河南(西部)、陕西(南部)和四川(北部和东部)。生于海拔1400—2000米的阴湿山坡、沟边或林下。鳞茎可食用。

41. 多叶韭 图 59

Allium plurifoliatum Rendle in Journ. of Bot. 44: 43, t. 476, f. 5—7. 1906.

鳞茎常数枚簇生,为基部增粗的圆柱状,粗0.3—1厘米;鳞茎外皮黑褐色至黄褐色,破裂,老时常纤维状,有时略呈网状。叶条形,扁平,近与花茎等长,宽2—6(—8)毫米,先端长渐尖,边缘向下反卷,下面的颜色比上面的淡,干时亦能辨别。花茎圆柱状,高15—40厘米,中部以下被叶鞘;总苞单侧开裂,比伞形花序短,具短喙,宿存或早落;伞形花序稍松散;小花梗近等长,比花被片长2—4倍,果期更长,基部无小苞片;花淡红色、淡紫色至紫色;花被片长3.5—5(—7)毫米,宽1.5—2.4(—3.4)毫米,内轮的卵状矩圆形,先端近平截或钝圆,外轮卵形,舟状,比内轮的稍短;花丝等长,为花被片长度的1.5—2倍,仅基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大,扩大部分每侧各具1枚高(1—)2—3毫米的齿片,齿片顶端常具2至数枚不规则的小齿;子房倒卵状,腹缝线基部具有帘的凹陷蜜穴;花柱伸出花被外。 花果期8—10月。




图 59 多叶韭 *Allium plurifoliatum* Rendle
(王金凤绘)

产四川、甘肃、陕西、湖北(西北部)和安徽(黄山)。生于海拔1600—3300米的山坡、草地或林下。

本种与天蒜 *A. paepalanthoides* Airy-Shaw 在花的结构上非常相似,其区别点仅在于天蒜的叶为宽条形至条状披针形,总苞具长喙,有时喙可长达7厘米,花白色。

41a. 雾灵韭(变种)

var. *stenodon* (Nakai et Kitag.) J. M. Xu, comb. nov. — *A. stenodon* Nakai et Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. 4, 1: 18, t. 6. 1934; 刘慎谔