

或林下。

本种花被片的宽度变化很大,形态可以从条形直到椭圆状矩圆形,若仅以其两端类型对比,差别很大,但大量的中间类型则使两端很自然地联系起来。如外轮花被片的宽度变化为 1.9—2—2.4—2.6—3.2—3.6—3.8—4 毫米,其形态则由条形逐渐变宽而为椭圆状矩圆形。尽管花被片的形态有很大的变异,而在不少重要特征上则是很稳定和一致的,如内轮花被片总比外轮的狭,花丝都短于花被片,在为花被片长度的 1/2 上下变化,花丝基部合生部分长约 1 毫米,子房两端收狭等等。基于这些,我们认为作为一个种来处理较妥。

43. 梭沙韭 图 61

Allium forrestii Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. 5: 302. 1912.

鳞茎数枚聚生,圆柱状,粗 0.4—0.7 厘米;鳞茎外皮灰褐色,破裂成纤维状,基部常近网状,稀条状破裂。叶狭条形,比花葶短,宽 1.5—3(—5) 毫米;花葶圆柱状,高 15—30 厘米,下部被常呈紫色的叶鞘;总苞单侧开裂,早落;伞形花序具少数较松散的花;小花梗近等长,比花被片短或近等长,基部无小苞片;花大,钟状开展,紫色至黑紫色;花被片椭圆形至卵状椭圆形,或倒卵状椭圆形,先端钝圆,稀收缩为钝头,近等长,长 8—13 毫米,宽 4—4.5 毫米;花丝等长,约为花被片长度的 1/2,基部合生并与花被片贴生,合生部分高约 1 毫米,内轮的基部有时扩大,罕在扩大部分的每侧各具 1 小齿,外轮的锥形;子房近球状,腹缝线基部具不甚明显的蜜穴;花柱比子房短或近等长;柱头常 3 浅裂。花果期 8—10 月。

产云南(西北部)、四川(西南部)和西藏(察隅、昌都)。生于海拔 2700—4200 米的碎石山坡或草坡上。

44. 钟花韭 图 62

Allium kingdonii Stearn in Bull. Brit. Mus. Bot. 2 (6): 175, t. 10, a, pl. 9.

1960.

鳞茎常单生,圆柱状,粗约 6 毫米;鳞茎外皮暗黄红色,薄革质,条裂。叶条形,顶端钝尖,比花葶短,宽 1.5—4 毫米。花葶圆柱状,高 10—30 厘米,粗 1—2.5 毫米,下部被叶鞘;总苞淡紫红色,2 裂,具短喙,宿存或早落;伞形花序具花数朵,松散;小花梗不等长,常稍




图 61 梭沙韭 *Allium forrestii* Diels (王金凤绘)