

产黑龙江西部(满洲里)和新疆北部(塔城、托里一带)。生于石坡上。苏联西伯利亚东部以及蒙古也有分布。

本种与山韭 *A. senescens* L. 极为相似, 不同处仅在于山韭的叶为条形。

49. 泰山韭 图 64

Allium taishanense J. M. Xu, sp. nov. in Addenda.

具斜生的根状茎。鳞茎单生或少数聚生, 近圆柱状, 粗约 5 毫米; 鳞茎外皮灰黑色, 内皮白色, 均为膜质, 不破裂。叶宽条形, 比花葶短或近与其相等, 中部宽 7—10 毫米, 向两端收狭, 背面具 1 纵棱, 沿叶缘和纵棱具细糙齿。花葶圆柱状, 具 2 纵棱, 沿棱具细糙齿, 高 22—37 厘米, 中部粗 1.5—3 毫米, 下部被光滑的叶鞘; 总苞 2 裂, 远比花序短, 宿存; 伞形花序近半球状, 多花, 松散; 小花梗近等长, 比花被片长 2—3 倍, 基部无小苞片; 花淡红色至白色; 花被片卵状矩圆形, 内轮的长而宽, 长 3.7—4.6 毫米, 宽 2.2—2.5 毫米, 先端极钝, 外轮的长 3.2—3.8 毫米, 宽 1.7—1.9 毫米, 先端钝圆; 花丝等长, 略长于花被片, 基部合生并与花被片贴生, 合生部分高约 0.6 毫米, 内轮的基部扩大成三角形, 约比外轮的基部宽 1 倍; 子房倒卵状球形, 腹缝线基部具有帘的凹陷蜜穴, 每室 2 胚珠; 花柱伸出花被外。 花期 9 月。

产山东泰山地区。生于海拔 300—600 米的山坡。

本种与山韭 *A. senescens* L. 相似, 不

同处在于山韭的条形叶背面无纵棱, 子房无凹陷的蜜穴。

50. 冀韭

Allium chiwui Wang et Tang, 静生生物所汇报, Bot. Ser. 7: 294. 1937.

根状茎粗壮, 横走。鳞茎单生或数枚聚生, 近圆锥状, 粗 7—13 毫米; 鳞茎外皮灰黑色, 有时带紫红色, 膜质, 内皮白色, 不破裂。叶条形, 扁平, 比花葶短或近等长, 宽 2—5 毫米, 先端钝圆, 光滑。花葶圆柱状, 具 2 纵棱, 高 13—30 厘米, 粗 1.5—2.5 毫米, 下部被叶鞘; 总苞 2 裂, 宿存; 伞形花序半球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 近与花被片等长, 基部无小苞片; 花白色至黄色; 花被片长 4—7 毫米, 宽 2—2.5 毫米, 内轮的卵状矩圆形, 先端钝, 外轮的舟状卵形, 先端钝, 比内轮的稍短; 花丝等长, 等于或略长于花被片, 仅基部




图 64 泰山韭 *Allium taishanense* J. M. Xu
(吴彰桦绘)

合生并与花被片贴生,内轮的扩大成很狭的三角形,外轮的锥形;花药黄色;子房倒卵球状,基部无明显的蜜穴;花柱比子房长,伸出花被外。花期7月。

产河北小五台山和怀来。生于海拔2100—2500米的草坡。

本种与山韭 *A. senescens* L. 在鳞茎、叶形方面很相似,但山韭具淡红色至紫红色的花,小花梗基部常具小苞片而与本种不同。

51. 山韭 岩葱 图 65

Allium senescens L., Sp. Pl. ed. 1, 299. 1753. — *A. montanum* Schmidt, Fl. Boem. 6: 28. 1794. — *A. baicalense* Willd., Enum. Hort. Berol. 1: 360. 1809. — *A. spirale* Willd., ibid. Suppl. 17. 1813. — *A. laucum* Schrad., Hort. Goett. 1814. — *A. andersonii* G. Don, Monogr. All. 59. 1827. — *A. spurium* G. Don, l. c. — *A. fallax* Roem. et Schult., Syst. 7: (2) 1072. 1830. — *A. angulosum* L. var. *minum* Ledeb., Fl. Ross. 4: 180. 1852. — *A. saxicola* Kitag. in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. 2: 288. 1938. — *A. kungii* Nakai in Journ. Jap. Bot. 19: 316. 1943, excl. syn. *A. anisopodium* Ledeb. var. *zimmermannianum* Wang et Tang.

具粗壮的横生根状茎。鳞茎单生或数枚聚生,近狭卵状圆柱形或近圆锥状,粗0.5—2(—2.5)厘米;鳞茎外皮灰黑色至黑色,膜质,不破裂,内皮白色,有时带红色。叶狭条形至宽条形,肥厚,基部近半圆柱状,上部扁平,有时略呈镰状弯曲,短于或稍长于花葶,宽2—10毫米,先端钝圆,叶缘和纵脉有时具极细的糙齿。花葶圆柱状,常具2纵棱,有时纵棱变成窄翅而使花葶成为二棱柱状,高度变化很大,有的不到10厘米,而有的则可高达65厘米,粗1—5毫米,下部被叶鞘;总苞2裂,宿存;伞形花序半球状至近球状,具多而稍密集的花;小花梗近等长,比花被片长2—4倍,稀更短,基部具小苞片,稀无小苞片;花紫红色至淡紫色;花被片长3.2—6毫米,




图 65 山韭 *Allium senescens* L. (王金凤绘)

宽1.6—2.5毫米,内轮的矩圆状卵形至卵形,先端钝圆并常具不规则的小齿,外轮的卵形,舟状,略短;花丝等长,从比花被片略长直至为其长的1.5倍,仅基部合生并与花被片贴生,内轮的扩大成披针状狭三角形,外轮的锥形;子房倒卵状球形至近球状,基部无凹陷的蜜穴;花柱伸出花被外。花果期7—9月。