

其1倍长,基部无小苞片;花紫红色至淡红色,有光泽;花被片披针形至条状披针形,长6—8毫米,宽1.5—2毫米,外轮的稍短;花丝等长,锥形,从与花被片近等长直到为其长的1.5倍,仅基部合生并与花被片贴生;子房近球状,腹缝线基部具凹陷的蜜穴;花柱伸出花被外。 花果期6—8月。

产新疆和甘肃(西北部)。生于海拔1500—3500米的阴湿山坡、草地或林下。苏联中亚和西伯利亚西部也有分布。

54. 镰叶韭 图 67

Allium carolinianum DC. in Redouté, Liliac. 2: t. 101. 1804; Stearn in Bull. Brit. Mus. Bot. 2 (6): 173. 1960.—*A. blandum* Wall., Pl. As. Par. 3: 38, t. 260. 1832.—*A. polyphyllum* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 509. 1842.—*A. obtusifolium* Klotz. in Klotz. et Garcke, Bot. Erg. Reise Pr. Waldemar 51, t. 95. 1862.—*A. thomsoni* Baker in Journ. of Bot. 12: 294: 1874.—*A. platyspathum* Schrenk var. *falcatum* Regel, All. Monogr. 135. 1875.—*A. aitchisoni* Boiss., Fl. Orient. 5: 248. 1882.

具不明显的短的生根状茎。鳞茎粗壮,单生或2—3枚聚生,狭卵状至卵状圆柱形,粗1—2.5厘米;鳞茎外皮褐色至黄褐色,革质,顶端破裂,常呈纤维状。叶宽条形,扁平,光滑,常呈镰状弯曲,钝头,比花葶短,宽(3—)5—15毫米。花葶粗壮,高20—40(—60)厘米,粗2—4毫米,下部被叶鞘;总苞常带紫色,2裂,近与花序等长,宿存;伞形花序球状,具多而密集的花;小花梗近等长,略短于或为花被片长的2倍,基部无小苞片;花紫红色、淡紫色、淡红色至白色;花被片狭矩圆形至矩圆形,长(4.5—)6—8(—9.4)毫米,宽1.5—3毫米,先端钝,有时微凹缺,内轮的常稍长,或有时内、外轮的近等长;花丝锥形,比花被片长,有时可长达1倍,基部合生并与花被片贴生,但内轮花丝的贴生部分高出合生部分约0.5毫米,外轮的则略低于合生部分,合生部分高约1毫米;子房近球状,腹缝线基部具凹陷的蜜穴;花柱伸出花被外。 花果期6月底至9月。

产甘肃(西部)、青海、新疆和西藏(西部和北部)。生于海拔2500—5000米的砾石山坡、向阳的林下和草地。苏联中亚地区、阿富汗至尼泊尔也有分布。

Regel在1887年把*Allium platyspathum* Schrenk.

f. falcatum 提升成种,取名为*Allium platystylum* Regel,在他的描述中将花的颜色记载为“亮草黄色”。但他1875年出版的*Alliorum Adhuc Cognitorum Monographia*




图 67 镰叶韭 *Allium carolinianum* DC. (王金凤绘)

这部专著中描述的 *β.falcatum* 的花为淡紫红色。*A. platystylum* Regel 与 *A. carolinianum* DC. 除了花的颜色不同外, 别的区别特征都是不稳定的。而花的颜色又不可靠, 故现将 *A. platystylum* Regel 归并入 *A. carolinianum* DC. 内。

55. 帕里韭

Allium phariense Rendle in Journ. of Bot. 44: 42. 1906; Stearn in Herbertia, 12: 84. 1947; et in Bull. Brit. Mus. Bot. 2 (6): 175, f. 10, e. 1960.

鳞茎单生或2—3枚聚生, 狭卵状, 粗0.7—1.4厘米; 鳞茎外皮灰黑色, 膜质或纸质, 不破裂或顶端破裂。叶条形, 扁平, 光滑, 镰状弯曲, 与花葶等长或稍长, 宽2—5(—7)毫米。花葶圆柱状, 高6—10厘米, 粗1—3毫米, 下部被叶鞘, 上部俯垂; 总苞2裂或单侧开裂, 具很短的喙, 膜质, 带紫色, 略短于花葶, 宿存; 伞形花序球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 比花被片长1.5—2倍, 基部无小苞片; 花白色, 干后可见紫色中脉; 花被片狭卵形至倒卵状矩圆形, 长4.5—6毫米, 宽2—2.5毫米, 内轮的有时稍长而窄, 先端钝, 有时略凹陷; 花丝等长, 锥形, 比花被片长1/4—1/2, 基部合生并与花被片贴生, 合生部分高约1毫米; 子房近球状, 腹缝线基部无凹陷的蜜穴; 花柱伸出花被外。 花果期7—8月。

产西藏南部。生于海拔4400—5200米的砾石山坡或草地。

本种与镰叶韭 *A. carolinianum* DC. 很相似, 不同处仅在于镰叶韭的鳞茎外皮革质, 褐色至黄褐色, 植株高大, 花葶高20厘米以上, 叶比花葶短, 子房基部具凹陷的蜜穴。

56. 高葶韭

Allium obliquum L., Sp. Pl. ed. 1, 296. 1753.

植株常粗壮。鳞茎单生, 卵状矩圆形, 粗2—3厘米; 鳞茎外皮淡褐色至褐色, 革质, 不破裂。叶宽条形, 比花葶短, 宽0.5—2厘米, 向先端渐狭。花葶粗壮, 高60—100厘米, 中部以上被叶鞘。总苞1—2裂, 宿存; 伞形花序球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 比花被片长2—4倍, 基部具小苞片; 花淡黄色至黄绿色; 花被片长4—5.5毫米, 宽1.5—2.4毫米, 内轮的卵形, 外轮的矩圆形至矩圆状卵形, 比内轮的稍短而狭; 花丝等长, 约为花被片长的1.5倍, 基部合生并与花被片贴生, 单一, 锥形; 子房卵状, 腹缝线基部具有帘的蜜穴; 花柱伸出花被外。 花果期6—7月。

产新疆西北部的塔城地区。生于草地或山坡林地。从欧洲中部经苏联中亚直到西伯利亚都有分布。

57. 北疆韭

Allium hymenorrhizum Ledeb., Fl. Alt. 2: 12, 1830.——*A. macrorrhizum* Boiss., Diagn. Pl. Or. 1 (13): 32. 1853.

鳞茎单生或数枚聚生, 近圆柱状, 粗约1.5厘米; 鳞茎外皮红褐色, 革质, 具光泽, 片状破裂。叶4—6枚, 条形, 扁平, 光滑, 短于花葶, 宽2—6毫米。花葶圆柱状, 高30—90