

这部专著中描述的 *β.falcatum* 的花为淡紫红色。*A. platystylum* Regel 与 *A. carolinianum* DC. 除了花的颜色不同外, 别的区别特征都是不稳定的。而花的颜色又不可靠, 故现将 *A. platystylum* Regel 归并入 *A. carolinianum* DC. 内。

55. 帕里韭

Allium phariense Rendle in Journ. of Bot. 44: 42. 1906; Stearn in Herbertia, 12: 84. 1947; et in Bull. Brit. Mus. Bot. 2 (6): 175, f. 10, e. 1960.

鳞茎单生或2—3枚聚生, 狭卵状, 粗0.7—1.4厘米; 鳞茎外皮灰黑色, 膜质或纸质, 不破裂或顶端破裂。叶条形, 扁平, 光滑, 镰状弯曲, 与花葶等长或稍长, 宽2—5(—7)毫米。花葶圆柱状, 高6—10厘米, 粗1—3毫米, 下部被叶鞘, 上部俯垂; 总苞2裂或单侧开裂, 具很短的喙, 膜质, 带紫色, 略短于花葶, 宿存; 伞形花序球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 比花被片长1.5—2倍, 基部无小苞片; 花白色, 干后可见紫色中脉; 花被片狭卵形至倒卵状矩圆形, 长4.5—6毫米, 宽2—2.5毫米, 内轮的有时稍长而窄, 先端钝, 有时略凹陷; 花丝等长, 锥形, 比花被片长1/4—1/2, 基部合生并与花被片贴生, 合生部分高约1毫米; 子房近球状, 腹缝线基部无凹陷的蜜穴; 花柱伸出花被外。 花果期7—8月。

产西藏南部。生于海拔4400—5200米的砾石山坡或草地。

本种与镰叶韭 *A. carolinianum* DC. 很相似, 不同处仅在于镰叶韭的鳞茎外皮革质, 褐色至黄褐色, 植株高大, 花葶高20厘米以上, 叶比花葶短, 子房基部具凹陷的蜜穴。

56. 高葶韭

Allium obliquum L., Sp. Pl. ed. 1, 296. 1753.

植株常粗壮。鳞茎单生, 卵状矩圆形, 粗2—3厘米; 鳞茎外皮淡褐色至褐色, 革质, 不破裂。叶宽条形, 比花葶短, 宽0.5—2厘米, 向先端渐狭。花葶粗壮, 高60—100厘米, 中部以上被叶鞘。总苞1—2裂, 宿存; 伞形花序球状, 具多而密集的花; 小花梗近等长, 比花被片长2—4倍, 基部具小苞片; 花淡黄色至黄绿色; 花被片长4—5.5毫米, 宽1.5—2.4毫米, 内轮的卵形, 外轮的矩圆形至矩圆状卵形, 比内轮的稍短而狭; 花丝等长, 约为花被片长的1.5倍, 基部合生并与花被片贴生, 单一, 锥形; 子房卵状, 腹缝线基部具有帘的蜜穴; 花柱伸出花被外。 花果期6—7月。

产新疆西北部的塔城地区。生于草地或山坡林地。从欧洲中部经苏联中亚直到西伯利亚都有分布。

57. 北疆韭

Allium hymenorrhizum Ledeb., Fl. Alt. 2: 12, 1830. — *A. macrorrhizum* Boiss., Diagn. Pl. Or. 1 (13): 32. 1853.

鳞茎单生或数枚聚生, 近圆柱状, 粗约1.5厘米; 鳞茎外皮红褐色, 革质, 具光泽, 片状破裂。叶4—6枚, 条形, 扁平, 光滑, 短于花葶, 宽2—6毫米。花葶圆柱状, 高30—90