

厘米,约 $1/2$ 被疏离的光滑叶鞘。总苞单侧开裂,近与花序等长,具短喙,宿存或早落;伞形花序球状或半球状,具多而密集的花;小花梗近等长,比花被片长 $1.5-2$ 倍,果期稍伸长,基部无小苞片;花淡红色至紫红色;内轮花被片狭矩圆状椭圆形,长 $4.6-5.5$ 毫米,宽 $1.3-1.6$ 毫米,先端钝圆,比外轮的稍长而宽,外轮的披针形至椭圆状披针形,长 $4-4.5$ 毫米,宽 $1.1-1.2$ 毫米,先端钝头;花丝等长,比花被片长 $1/4-1$ 倍,单一,基部合生并与花被片贴生,分离部分锥形;子房倒卵状至近球状,腹缝线基部具凹陷的蜜穴;花柱伸出花被外。花期 8 月。

产新疆北部。生于草地。伊朗、苏联中亚和西伯利亚西部也有分布。

57a. 旱生韭(变种) 图 68

var. *dentatum* J. M. Xu, var. nov. in Addenda.

与北疆韭的区别仅在于本变种的內轮花丝基部每侧各具 1 齿。

产新疆富蕴和昭苏地区。生于海拔 1100—1700 米的干旱草原或草场。




图 68 旱生韭 *Allium hymenorrhizum* Ledeb.
var. *dentatum* J. M. Xu (王金凤绘)



图 69 草地韭 *Allium kaschianum* Regel
(吴影桦绘)

58. 草地韭 图 69

Allium kaschianum Regel in Act. Hort. Petrop. 10: 338, t. 3, f. 2. 1887.

鳞茎少数聚生,圆柱状,粗 $0.5-1(-1.5)$ 厘米;鳞茎外皮棕色,薄革质,常破裂成狭条状。叶狭条形,比花茎略短或略长,宽 $1-1.5(-3)$ 毫米,边缘具细糙齿。花茎圆柱状,

高 15—40 厘米,中部粗约 1.5 毫米, $1/4$ — $1/2$ 被叶鞘;总苞单侧开裂或 2 裂,具短喙,近与花序等长,宿存;伞形花序半球状至球状,具较多而紧密排列的花;小花梗近等长,短于或等长于花被片,基部无小苞片;花淡紫色;花被片狭矩圆形至倒卵状狭矩圆形,先端钝圆或微凹,长 3—5 毫米,宽 1—1.8 毫米,内轮的较长;花丝等长,锥形,约为花被片长的 1.5 倍,基部合生并与花被片贴生;子房球状,基部不具凹陷的蜜穴;花柱远比子房长,伸出花被外。 花果期 7—9 月。

产新疆西北部。生于山区草地和冲积平原上。

59. 丝叶韭 图版 47: 4—6

Allium setifolium Schrenk, Enum. Pl. Nov. 1: 6. 1841.

鳞茎数枚聚生,狭卵状或卵状圆柱形,粗 0.5—1 厘米;鳞茎外皮淡黄褐色,革质,老时因内皮的生长外皮常一侧破裂,顶端条裂。叶 2—3 枚,毛发状,光滑,短于或与花茎近等

长,粗不到 0.3 毫米。花茎圆柱状,纤细,高 5—10 厘米,粗 0.3—0.5 毫米,下部被叶鞘;总苞 2 裂,远比花茎短;伞形花序具少数花;小花梗近等长,从等长于花被片长直到为其 1 倍长,基部具小苞片;花淡红色或红色;花被片具紫色中脉,披针形至矩圆状披针形,长 5—7 毫米;花丝近等长,约为花被片长度的 $2/3$,基部 $1/3$ — $1/2$ 合生并与花被片贴生,分离部分的基部扩大成三角形,向上收狭为锥形,内轮花丝扩大部分的基部比外轮的宽;子房椭圆球状,腹缝线基部具有窄的凹陷蜜穴;花柱不伸出花被外。 花果期 6—8 月。

产新疆北部。生于石质山坡或荒漠地带。苏联中亚地区也有分布。

60. 蜜囊韭 图 70

Allium subtilissimum Ledeb., Fl. Alt.

2: 22. 1830.

具不明显的直生根状茎。鳞茎数枚或更多聚生,狭卵状圆柱形或下部稍增粗的圆柱状,粗 0.5—1 厘米;鳞茎外皮淡灰褐色,略带红色,膜质或厚膜质,近于不破裂或顶端破裂。叶 3—5 枚,近圆柱状,纤细,常短于花茎,粗约 0.5 毫米,上面具沟槽,光滑。花茎纤细,高 5—20 厘米,粗 0.5—1 毫米,光滑,下部被叶鞘;总苞 2 裂,具与裂片近等长的喙,宿存;伞形花序具少数花,松散;小花梗近等长,比花被片长 2—3 (—4) 倍,基部具小苞片;花淡红色至淡红紫色,近星芒状开展;内轮花被片矩圆状椭圆形,长 3.7—5 毫米,宽 1.3—2.1 毫米,先端具短尖头,外轮的卵状椭圆形,舟状,稍短而狭,先端具短尖头;花丝等长,




图 70 蜜囊韭 *Allium subtilissimum* Ledeb.
(吴影桦绘)