

长0.5—2毫米。 花果期7—9月。

产青海和甘肃。生于海拔2900—3900米的向阳山坡或干草原上。

69. 坛丝韭 图74

Allium weschniakowii Regel in Act. Hort. Petrop. 6: 531. 1880, et 10: 342, t. 8, f. 3. 1887.

鳞茎聚生，圆柱状，粗约0.5厘米；鳞茎外皮污灰色，有时带褐色，膜质，近于不破裂。叶3—4枚，半圆柱状，纤细，短于花葶，宽0.5—1毫米，上面具沟槽，光滑。花葶纤细，高9—16厘米，粗约1毫米，具细纵棱，下部被叶鞘；总苞膜质，单侧开裂或2裂，裂片具短喙，宿存；伞形花序具少数花，很松散；小花梗近等长，为花被片的1.5—2倍长，基部无小苞片；花淡红色至淡紫红色，钟状开展；内轮花被片矩圆状椭圆形，长6—7毫米，宽2—2.5毫米，先端钝圆，外轮的花被片略比内轮的短，卵状椭圆形，长5—6毫米，宽2—2.5毫米，先端钝；花丝为花被片长的 $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ ，约 $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{5}$ 合生成坛状，内轮花丝在近中部与花被片贴生，分离部分为狭三角形，或基部呈肩状扩大，有时扩大部分每侧各具1钝齿，外轮花丝在近基部与花被片贴生，分离部分比内轮的短，近锥形；子房椭圆状至卵球状；花柱不伸出花被外。 花期8月。




图74 坛丝韭 *Allium weschniakowii* Regel (王金凤绘)

产新疆西部的温泉、五台和三台一带。生于山坡或草地上。苏联中亚地区也有分布。

70. 管丝韭

Allium semenovii Regel in Bull. Soc. Nat. Mosc. 41 (1): 449. 1868. — *A. tristylum* Regel in Act. Hort. Petrop. 10: 333, t. 2, f. 3. 1887.

鳞茎单生或数枚聚生，圆柱状，粗0.6—1.5厘米；鳞茎外皮污褐色，破裂成纤维状，常近网状。叶宽条形，常比花葶长，稀稍短，宽0.5—1.5厘米，在标本上常对褶。花葶圆柱状，高(2—)8—52厘米，中部粗2—5毫米，常中部以下被叶鞘；总苞带色，2裂，宿存；伞形花序卵球状至球状，具多而密集的花；小花梗不等长，外层的远比花被片短，内层的近与花被片等长或略长，基部无小苞片；花大，黄色，后变红色、紫红色，有光泽；花被片披针形至卵状披针形，长9.5—16.8毫米，宽3—5.1毫米，向先端渐尖，边缘有时具1至数枚不规则的小齿，内轮的比外轮的短；花丝为花被片长的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ ， $\frac{3}{5}$ — $\frac{4}{5}$ 合生成管状，合生部分的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ 与花被片贴生，内轮花丝分离部分的基部扩大，比外轮的基部宽，扩大部分每侧常各具1齿；子房近球状，腹缝线基部具有帘的蜜穴；花柱比子房短；柱头3裂。花果期5月底至8月初。