

长的小花梗,红紫色的花,花后反折而扭转的花被片以及子房基部具凹陷的蜜穴等特征,易与本种相区别。

96. 星花蒜 图 98

Allium decipiens Fisch. ex Roem. et Schult., Syst. 7: 1117. 1830.—*A. tulipifolium* Ledeb., Ic. Pl. Ross. Alt. 2: 13, t. 137. 1830.—*A. roborowskianum* Regel in Act. Hort. Petrop. 10: 359, t. 7, f. 4. 1887.




图 98 星花蒜 *Allium decipiens* Fisch. ex Roem. et Schult. (吴彰桦绘)

鳞茎单生,卵球状至球状,宽0.75—2厘米;鳞茎外皮带黑色,纸质,老时常顶端破裂。叶宽条形至条状披针形,远比花葶短,宽0.5—2(—3)厘米。花葶圆柱状,高20—50(—70)厘米,下部被叶鞘;总苞2裂,宿存;伞形花序近半球状或近球状,多花,较松散;小花梗近等长,比花被片长2—6倍,基部无小苞片;花星芒状开展,淡红紫色至紫红色;花被片椭圆形,钝头,等长,长4.5—5毫米,宽约2毫米,花后反折并扭卷;花丝等长,近与花被片等长,基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大,外轮的锥形,基部约为内轮的1/2宽;子房近球状,外壁具细的疣状突起,腹缝线基部具凹陷的蜜穴,每室4胚珠;花柱约与子房等长;柱头点状。 花果期5—6月。

产新疆西北部(额敏及霍布克赛尔地区)。生于山地阴坡。苏联中亚和西伯利亚西部也有分布。

本种与多籽蒜 *A. fetisowii* Regel 很相似,不同处在于多籽蒜的伞形花序很紧密;小花梗比花被片长2—3倍;花被片条形至条状披针形,长(4—)5—7毫米,宽1—1.2毫米;子房每室4—6胚珠。

97. 多籽蒜 图 99

Allium fetisowii Regel in Act. Hort. Petrop. 5: 631. 1878.—*A. simile* Regel, l. c. 10: 359. 1887.—*A. tschimganicum* B. Fedtsch., Раст. Түрк. 237. 1915.

鳞茎单生,球状,宽1—2.5厘米;鳞茎外皮灰黑色,纸质,老时顶端破裂。叶宽条形,远比花葶短,宽2—15毫米。花葶圆柱状,高30—70厘米,下部被叶鞘;总苞2裂,宿存;伞形花序半球状至球状,多花,紧密;小花梗近等长,比花被片长2—3倍,基部无小苞片;花星芒状开展,紫红色;花被片条形至条状披针形,钝头或近钝头,等长,长(4—)5—7

毫米,宽1—1.2毫米,花后期反折并扭卷;花丝等长,比花被片短 $1/4$ — $1/5$,基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大成方形,扩大部分每侧各具1—2齿,稀扩大成三角形而无齿,外轮的锥形;子房近球状,每室具4—6胚珠,外壁具细的疣状突起,腹缝线基部具缝状的蜜穴;花柱与子房近等长。 花果期4—6月。

产新疆西北部的新源县一带。生于山麓荒地。苏联中亚地区也有分布。

组9. 合被组——Sect. *Caloscordum*
(Herb.) Baker

98. 合被韭

Allium tubiflorum Rendle in Journ.
of Bot. 44: 44, t. 476, c 8—11. 1906.

植株无葱蒜气味。鳞茎单生,卵球状至近球状;鳞茎外皮灰黑色,膜质,不破裂,内层白色,膜质。叶圆柱状或近半圆柱状,中空,具纵棱,沿棱具细糙齿,等长于或长于花葶,宽1—3毫米。花葶圆柱状,高15—30(—40)




图99 多籽蒜 *Allium fetisowii* Regel (吴彰桦绘)

厘米,粗1—1.5毫米,下部被叶鞘;总苞单侧开裂,宿存;伞形花序疏散;小花梗不等长,长0.8—4(—7)厘米,基部具小苞片;花红色至紫红色;花被片长5—7(—8)毫米,宽1.5—2(—2.4)毫米,基部约2毫米互相靠合成管状(即靠合部分尚能看见外轮花被片的分离边缘),分离部分星状开展,卵状矩圆形,先端钝,或具短尖头,内轮的常与外轮等长或稍长,宽则近相等;花丝约为花被片长的 $1/2$,基部约2毫米合生并与靠合成管的花被片贴生,分离部分锥形;子房圆锥状球形,每室(3—)4胚珠,稀为其中1或2室具5—6胚珠;花柱常与子房近等长;柱头3裂。 花果期7月底至10月初。

产四川、湖北、甘肃、陕西、山西、河南和河北。生于海拔2000米以下的山坡、石缝或灌丛下。

本种与长梗韭 *A. neriniflorum* Baker 极相似,不同处在于后者植株高大,小花梗长(4.5—)7—11厘米,花被片长7—10毫米,子房每室具6(—8)胚珠,极少为5枚。

99. 长梗韭 图100

Allium neriniflorum (Herb.) Baker in Journ. of Bot. 3: 290. 1874.——
Caloscordum neriniflorum Herb. in Bot. Reg. 30: 67. 1844.

植株无葱蒜气味。鳞茎单生,卵球状至近球状,宽1—2厘米;鳞茎外皮灰黑色,膜