

毫米,宽1—1.2毫米,花后期反折并扭卷;花丝等长,比花被片短 $1/4$ — $1/5$,基部合生并与花被片贴生,内轮的基部扩大成方形,扩大部分每侧各具1—2齿,稀扩大成三角形而无齿,外轮的锥形;子房近球状,每室具4—6胚珠,外壁具细的疣状突起,腹缝线基部具缝状的蜜穴;花柱与子房近等长。 花果期4—6月。

产新疆西北部的新源县一带。生于山麓荒地。苏联中亚地区也有分布。

组9. 合被组——Sect. *Caloscordum*
(Herb.) Baker

98. 合被韭

Allium tubiflorum Rendle in Journ. of Bot. 44: 44, t. 476, c 8—11. 1906.

植株无葱蒜气味。鳞茎单生,卵球状至近球状;鳞茎外皮灰黑色,膜质,不破裂,内层白色,膜质。叶圆柱状或近半圆柱状,中空,具纵棱,沿棱具细糙齿,等长于或长于花葶,宽1—3毫米。花葶圆柱状,高15—30(—40)




图99 多籽蒜 *Allium fetisowii* Regel (吴彰桦绘)

厘米,粗1—1.5毫米,下部被叶鞘;总苞单侧开裂,宿存;伞形花序疏散;小花梗不等长,长0.8—4(—7)厘米,基部具小苞片;花红色至紫红色;花被片长5—7(—8)毫米,宽1.5—2(—2.4)毫米,基部约2毫米互相靠合成管状(即靠合部分尚能看见外轮花被片的分离边缘),分离部分星状开展,卵状矩圆形,先端钝,或具短尖头,内轮的常与外轮等长或稍长,宽则近相等;花丝约为花被片长的 $1/2$,基部约2毫米合生并与靠合成管的花被片贴生,分离部分锥形;子房圆锥状球形,每室(3—)4胚珠,稀为其中1或2室具5—6胚珠;花柱常与子房近等长;柱头3裂。 花果期7月底至10月初。

产四川、湖北、甘肃、陕西、山西、河南和河北。生于海拔2000米以下的山坡、石缝或灌丛下。

本种与长梗韭 *A. neriniflorum* Baker 极相似,不同处在于后者植株高大,小花梗长(4.5—)7—11厘米,花被片长7—10毫米,子房每室具6(—8)胚珠,极少为5枚。

99. 长梗韭 图100

Allium neriniflorum (Herb.) Baker in Journ. of Bot. 3: 290. 1874.——
Caloscordum neriniflorum Herb. in Bot. Reg. 30: 67. 1844.

植株无葱蒜气味。鳞茎单生,卵球状至近球状,宽1—2厘米;鳞茎外皮灰黑色,膜