

(Gagnep.) Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 31. 1940.

乔木状，高在3—4米以上。茎不分枝或分枝，树皮带灰褐色，幼枝有密环状叶痕。叶聚生于茎、枝顶端，几乎互相套迭，剑形，薄革质，长达70厘米，宽1.5—3厘米，向基部略变窄而后扩大，抱茎，无柄。圆锥花序长在30厘米以上；花序轴无毛或近无毛；花每3—7朵簇生，绿白色或淡黄色；花梗长5—7毫米，关节位于上部1/3处；花被片长6—7毫米，下部约1/4—1/5合生成短筒；花丝扁平，宽约0.5毫米，无红棕色疣点；花药长约1.2毫米；花柱稍短于子房。浆果直径约1厘米。花期7月。

产广东海南岛(崖县、乐东)。生于林中或干燥沙壤土上。也分布于越南、柬埔寨。

### 3. 长花龙血树 槟榔青(海南) 图版53: 2—4

*Dracaena angustifolia* Roxb., Fl. Ind. ed. 2, 2: 155. 1832; Matsumura et Hay, in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 438. 1906; Gagnep. in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 798. 1934.

灌木状，高1—3米。茎不分枝或稍分枝，有疏的环状叶痕，皮灰色。叶生于茎上部或近顶端，彼此有一定距离，条状倒披针形，长20—30(—45)厘米，宽1.5—3(—5.5)厘米，中脉在中部以下明显，基部渐窄成柄状，有时有明显的柄，柄长2—6厘米。圆锥花序长30—50厘米；花序轴无毛；花每2—3朵簇生或单生，绿白色；花梗长7—8毫米，关节位于上部或近顶端；花被圆筒状，长19—23毫米；花被片下部合生成筒，筒长7—8毫米，裂片长11—16毫米；花丝丝状，花药长2—3毫米；花柱长为子房的5—8倍。浆果直径约8—12毫米，桔黄色，具1—2颗种子。花期3—5月，果期6—8月。

产广东(海南岛)、台湾(高雄、台南)和云南(河口)。生于海拔较低的林中或灌丛下干燥的沙土上。东南亚广泛分布。

### 4. 细枝龙血树 图版53: 1

*Dracaena gracilis* Wall. ex Baker in Journ. of Bot. 11: 264. 1873; et in Journ. Linn. Soc. Bot. 14: 534. 1874, pro var.; Gagnep. in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 799. 1934.


大灌木状，高1—5米。茎常具许多分枝，分枝较细，具疏的环状叶痕。叶生于分枝上部或近顶端，彼此有一定距离，狭椭圆状披针形或条状披针形，长10—15厘米，宽2—3厘米或更宽，中脉明显，有柄，柄长1厘米。圆锥花序生于分枝顶端，较短，长在10厘米以下；花通常单生，据记载长可达2.2厘米；花梗长达1厘米，关节位于上部。

产广西南部，具体地点不详。分布于东南亚，从越南至印度尼西亚都有。

### 5. 矮龙血树

*Dracaena terniflora* Roxb., Fl. Ind. ed. 2, 2: 159. 1832; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 328. 1892; Cooke, Fl. Bomb. 2: 764. 1902.

小灌木状，高不到1米，具粗厚的根。茎不分枝或有时稍分枝，有疏的环状叶痕。叶



1.细枝龙血树 *Dracaena gracilis* Wall. ex Baker: 分枝的一部分; 2—4.长花龙血树 *D. angustifolia* Roxb.: 2.茎和叶的一部分, 3.花序的一部分, 4.花。(刘春荣绘)