

18. 铃兰族——Convallarieae

具根状茎；叶簇生或单生于根状茎上或茎上；花葶侧生；花通常排成穗状花序或总状花序，较少单朵或几朵生于根状茎上；花被片合生或离生；雄蕊6或8（—10），着生于花被筒上或花被片基部；花药基着或背着，后者有时呈丁字状，内向纵裂；子房3—4室，每室2—6（—10）个胚珠；浆果。

约8属，我国产7属。

39. 白穗花属——*Speirantha* Baker

Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. **14**: 563. 1875.

多年生草本，基部包有膜质的或裂成纤维状的鞘；根状茎斜生，较粗，从节上生出又长又细的匍匐茎，有多数分枝的纤维根。叶基生，几枚，多少成簇，并行脉多而密。花葶侧生，短于叶，顶端有总状花序；苞片近膜质；花梗直，顶端有关节，果熟时从关节处脱落；花被片分离，披针形，反折；雄蕊6，着生于花被片基部；花药背着，丁字状，内向纵裂；子房近球形，3室，每室有胚珠3—4颗，花柱细长，柱头小。果实为一浆果。

为我国特有的单种属，产华东地区。

1. 白穗花 图版 1: 1—3

Speirantha gardenii (Hook.) Baill., Hist. des Pl. **12**: 524. 1894. ——*Albusa?* *gardenii* Hook. in Curtis's Bot. Mag. **81**: t. 4842. 1855. ——*Speirantha convallarioides* Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. **14**: 563. 1875.

根状茎圆柱形，长2—12厘米或更长，直径0.3—1.5厘米。叶4—8枚，倒披针形、披针形或长椭圆形，长10—20厘米，宽3—5厘米，先端渐尖，下部渐狭成柄，柄基部扩大成膜质鞘。花葶高13—20厘米；总状花序长4—6厘米，宽2.5—4厘米，有花12—18朵；苞片白色或稍带红色，短于花梗；花梗长7—17毫米；花被片披针形，先端钝，长4—6毫米，宽1.5—2.4毫米，开展，有一条脉；雄蕊短于花被片，花丝长3毫米，花药椭圆形，长约2毫米；子房长2毫米，花柱长2毫米。浆果近球形，直径约5毫米。花期5—6月，果期7月。

产江苏、浙江(昌化)、安徽(黄山)和江西。生长在山谷溪边和阔叶树林下，海拔630—900米。