

Mus. Bot. Lugd.-Bat. **3**: 148. 1867.——*C. majalis* L. var. *manshurica* Kom. in Kom. et Klob.-Alisova, Abridg. Manual Identif. Far East Pl. 153. 1925.

植株全部无毛,高18—30厘米,常成片生长。叶椭圆形或卵状披针形,长7—20厘米,宽3—8.5厘米,先端近急尖,基部楔形;叶柄长8—20厘米。花葶高15—30厘米,稍外弯;苞片披针形,短于花梗;花梗长6—15毫米,近顶端有关节,果熟时从关节处脱落;花白色,长宽各5—7毫米;裂片卵状三角形,先端锐尖,有1脉;花丝稍短于花药,向基部扩大,花药近矩圆形;花柱柱状,长2.5—3毫米。浆果直径6—12毫米,熟后红色,稍下垂。种子扁圆形或双凸状,表面有细网纹,直径3毫米。花期5—6月,果期7—9月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、浙江和湖南。生阴坡林下潮湿处或沟边,海拔850—2500米。朝鲜、日本至欧洲、北美洲也很常见。带花全草供药用,有强心利尿之效。

42. 吉祥草属——*Reineckia* Kunth

Kunth in Abh. Akad. Berl. 29. 1842.

茎匍匐于地上,似根状茎,绿色,多节,顶端具叶簇;根聚生于叶簇的下面。花葶侧生,从一叶腋抽出,直立,较短;花较多,排列成穗状花序;苞片卵状三角形,膜质,淡褐色或带紫色;花被片合生成短管状,上部6裂;裂片在开花时反卷,与花被管近等长;雄蕊6,着生在花被管的喉部,花丝丝状,近基部贴生于花被筒上;花药背着,内向纵裂;子房瓶状,3室,每室有胚珠2颗,花柱细长,柱头头状,3裂。浆果球形,有数颗种子。

仅一种,分布于我国和日本。

1. 吉祥草 图版 2: 4—6

Reineckia carnea (Andr.) Kunth in Abh. Akad. Berl. 29. 1842.——*Sansevieria carnea* Andr., Bot. Rep. **5**: t. 361. 1804.——*S. sessiliflora* Ker-Gawl. in Curtis's Bot. Mag. **19**: t. 739. 1804.——*Reineckia yunnanensis* W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinb. **12**: 220. 1920.

茎粗2—3毫米,蔓延于地面,逐年向前延长或发出新枝,每节上有一残存的叶鞘,顶端的叶簇由于茎的连续生长,有时似长在茎的中部,两叶簇间可相距几厘米至10多厘米。叶每簇有3—8枚,条形至披针形,长10—38厘米,宽0.5—3.5厘米,先端渐尖,向下渐狭成柄,深绿色。花葶长5—15厘米;穗状花序长2—6.5厘米,上部的花