

tepala Hand.-Mzt. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien Math.-Naturw. Kl. **57**: 272. 1920; et Symb. Sin. **7**: 1211. 1936.

根状茎圆柱形，直径 1—1.5 厘米。叶 5—7 枚生于短茎上，纸质或近纸质，披针形，长 30—45 厘米，宽 2—4 厘米，先端渐尖，边缘皱波状；鞘叶披针形，长 7—15 厘米，先端渐尖，基部鞘状，膜质，黄色或黄绿色。穗状花序直立，长 3—4.5 厘米，宽 1—1.5 厘米；总花梗长 1—6 厘米，宽 3—4 毫米；苞片卵形，长 3.5—6.5 厘米，宽 3.5—5 毫米，先端渐尖，膜质，白色或淡绿色；花被长 5—10 毫米，花被喉部向内扩展成环状体，环状体表面平滑；花被筒长 2—5 毫米；裂片稍平展，三角状卵形，长 3—5 毫米，宽 3—4.5 毫米，肉质，黄色，边缘较薄，全缘；雄蕊着生于环状体里面，花丝极短，花药卵形，长 1—1.5 毫米；子房卵形，长 3 毫米，宽 2 毫米，花柱短，长约 1 毫米，柱头 3 裂。浆果球形。花期 5—6 月。

产四川(马边、峨边、雷波、南川一带)。生在林下，海拔 1800—3000 米。

44. 万年青属——*Rohdea* Roth

Roth, Nov. Pl. Sp. 196. 1821.

多年生草本。根状茎粗短，具许多纤维根，根上密生白色绵毛。叶基生，近两列套迭，成簇，向下部渐狭，但柄不明显，基部稍扩大。花葶侧生，于叶腋抽出，直立或稍弯曲；穗状花序多少肉质，密生多花；苞片膜质，卵形；花被球状钟形，顶端 6 浅裂；裂片短，内弯，肉质；雄蕊 6，由于花丝大部分贴生于花被筒上，离生部分很短，故似着生于花被筒上端；花药背着，内向开裂；子房球形，3 室，每室 2 个胚珠；花柱不明显，柱头 3 裂。浆果球形，具单颗种子。

仅 1 种，分布于我国和日本。

1. 万年青 图版 6

Rohdea japonica (Thunb.) Roth, Nov. Pl. Sp. 197. 1821. — *Orontium japonicum* Thunb., Fl. Jap. 144. 1784. — *Rohdea esquirolii* Lév. in Bull. Soc. Bot. France **54**: 371. 1907. — *R. sinensis* Lév. *ibid.*

根状茎粗 1.5—2.5 厘米。叶 3—6 枚，厚纸质，矩圆形、披针形或倒披针形，长 15—50 厘米，宽 2.5—7 厘米，先端急尖，基部稍狭，绿色，纵脉明显浮凸；鞘叶披针形，长 5—12 厘米。花葶短于叶，长 2.5—4 厘米；穗状花序长 3—4 厘米，宽 1.2—1.7 厘米；具几十朵密集的花；苞片卵形，膜质，短于花，长 2.5—6 毫米，宽 2—4 毫米；花被长 4—5 毫米，宽 6 毫米，淡黄色，裂片厚；花药卵形，长 1.4—1.5 毫米。浆果直径约 8 毫米，熟