

时红色。花期5—6月,果期9—11月。

产山东、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西、贵州、四川。生林下潮湿处或草地上,海拔750—1700米。

全株有清热解毒、散瘀止痛之效。各地常有盆栽供观赏。

45. 蜘蛛抱蛋属——*Aspidistra* Ker-Gawl.

Ker-Gawl. in Bot. Reg. 8:t. 628. 1822.——*Macrogyné* Link et Otto,

Ic. Pl. Select. t. 31. 1823.——*Colania* Gagnep. in Bull. Mus. Hist.

Nat. Paris, ser. 2, 4: 190. 1934.

多年生常绿草本;根状茎横走,细长或粗短,圆柱状或不规则的圆柱状,节上有覆瓦状鳞片,有较粗的纤维根;纤维根通常密生绵毛,但栽培的则较少或几乎不生绵毛。叶单生或2—4枚簇生于根状茎上,从卵形至带状,中脉较粗,在背面显著突出,侧脉较细,脉间有细横脉;叶柄明显或不明显,基部有3—4枚叶鞘,叶鞘通常紫褐色,最上部的1枚最长,枯后裂成纤维状。总花梗从根状茎上长出,通常较短,使花多少靠近地面,从下部至顶端有2—8枚苞片,其中1—2枚位于花基部;花单生于总花梗顶端;花被钟状或坛状,肉质,紫色或带紫色,少有带黄色,顶端通常6—8裂,少有4裂或10裂;雄蕊与花被裂片同数并和它对生,着生于花被筒上,一般靠近筒的基部;花丝很短或不明显;子房3—4室,每室2至多枚胚珠;花柱有关节或无关节;柱头多数呈盾状膨大,裂或不裂。浆果球形,通常具1颗种子。

约有11种,产于亚洲亚热带与热带山地。我国有8种,主要见于长江以南各省区。由于本属植物的叶终年青翠,故有“万年青”之名,国内外广泛栽培,作常绿盆景。某些野生阔叶种类的根状茎供药用。

分 种 检 索 表

1. 叶单生,各叶着生点有明显的距离,形状种种,但决不为带形。
 2. 花大,长30—35厘米,直径17—20毫米;花被裂片5—6枚,宽卵形或半圆形,长10—15毫米,强烈的覆瓦状排列……………1. **大花蜘蛛抱蛋** *A. tonkinensis* (Gagnep.) Wang et Lang
 2. 花较小,长不到25毫米,直径10—18毫米;花被裂片(4—)6—8(—9)枚,近三角形或矩圆状三角形,非强烈的覆瓦状排列。
 3. 花被裂片内侧的脊状隆起不为流苏状。
 4. 花被裂片矩圆状三角形,内面有多数乳突,有时有2—4条稍明显的脊状隆起;脊状隆起淡橙绿色或带紫色,上有多数小乳突;柱头裂片边缘不向上反卷……………

- 2. 九龙盘 *A. lurida* Ker-Gawl.
4. 花被裂片近三角形,内面无乳突,具4条特别肥厚、肉质、光滑、紫红色的脊状隆起;柱头裂片边缘向上反卷 3. 蜘蛛抱蛋 *A. elatior* Bl.
3. 花被裂片内侧具4条肉质的、裂成流苏状的脊状隆起 4. 流苏蜘蛛抱蛋 *A. fimbriata* Wang et Lang
1. 叶2—4枚簇生,带形或其它形状。
5. 叶带形,向基部渐狭而成不明显的柄(即叶片与叶柄无截然的界限);总花梗单生。
6. 花较小,坛状,长4.5—5毫米;花被裂片6枚或4枚,柱头直径1.5—2.5毫米,边缘有6枚或4枚圆齿 5. 小花蜘蛛抱蛋 *A. minutiflora* Stapf
6. 花较大,长15—22毫米。
7. 花钟状,花被裂片向外弯,内面有4条肉质脊状隆起;柱头上面沿裂缝有3(—4)条微凸的稜,3(—4)浅裂,裂片先端微缺,边缘向上反卷 6. 海南蜘蛛抱蛋 *A. hainanensis* Chun et How
7. 花坛状,花被裂片不向外弯,内面无肉质脊状隆起;柱头波状3浅裂,边缘不向上反卷 7. 丛生蜘蛛抱蛋 *A. caespitosa* P'ei
5. 叶卵状披针形或卵形,基部圆形或近圆形并骤然收狭成明显的柄(即叶片与叶柄有截然的界限);总花梗常成簇抽出 8. 卵叶蜘蛛抱蛋 *A. typica* Baill.

1. 大花蜘蛛抱蛋

Aspidistra tonkinensis (Gagnep.) Wang et Lang, comb. nov. — *Colania tonkinensis* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 4: 190. 1934; et in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 787. f. 75, 8—12. 1934.

根状茎圆柱状,直径4—5毫米,密生鞘状鳞片,肉质纤维根单生于节上。叶单生,彼此相距2—3厘米,披针状矩圆形,长13.5—18厘米,宽4—5.5厘米,两侧不等宽,先端渐尖,基部骤然收狭成明显的柄,边缘或多或少波状;叶柄纤细,长10—15厘米。总花梗短,长3厘米,具5枚苞片;苞片卵形,不等大,上面的长5—12毫米,下面的较短;花被钟状,长3—3.5厘米,直径1.7—2厘米,5—6裂;花被筒长2厘米,增厚;裂片强烈覆瓦状排列,宽卵形或半圆形,膜质,长10—12毫米,具3条主脉;雄蕊5—6枚,着生于花被筒基部上方5毫米处;花药长3毫米,近盾状,肾形;柱头盾状膨大,圆形,直径11毫米,5—6裂,裂片圆形,向下反折。

产云南东南部(屏边)。生长在海拔1800米的林下。也分布于越南。

2. 九龙盘 竹叶盘(四川),青蛇莲、蛇莲、接骨丹、蜈蚣草(四川成都),盘龙七、走石马、寸八节、地蕨叶(四川重庆),赶山鞭(江西),蜈蚣草、地蜈蚣、赶山鞭(湖南),竹叶根(浙江)

Aspidistra lurida Ker-Gawl. in Bot. Reg. 8: 628. 1822. — *Macrogyne conval-*