

- 2. 九龙盘 *A. lurida* Ker-Gawl.
4. 花被裂片近三角形,内面无乳突,具4条特别肥厚、肉质、光滑、紫红色的脊状隆起;柱头裂片边缘向上反卷 3. 蜘蛛抱蛋 *A. elatior* Bl.
3. 花被裂片内侧具4条肉质的、裂成流苏状的脊状隆起 4. 流苏蜘蛛抱蛋 *A. fimbriata* Wang et Lang
1. 叶2—4枚簇生,带形或其它形状。
5. 叶带形,向基部渐狭而成不明显的柄(即叶片与叶柄无截然的界限);总花梗单生。
6. 花较小,坛状,长4.5—5毫米;花被裂片6枚或4枚,柱头直径1.5—2.5毫米,边缘有6枚或4枚圆齿 5. 小花蜘蛛抱蛋 *A. minutiflora* Stapf
6. 花较大,长15—22毫米。
7. 花钟状,花被裂片向外弯,内面有4条肉质脊状隆起;柱头上面沿裂缝有3(—4)条微凸的稜,3(—4)浅裂,裂片先端微缺,边缘向上反卷 6. 海南蜘蛛抱蛋 *A. hainanensis* Chun et How
7. 花坛状,花被裂片不向外弯,内面无肉质脊状隆起;柱头波状3浅裂,边缘不向上反卷 7. 丛生蜘蛛抱蛋 *A. caespitosa* P'ei
5. 叶卵状披针形或卵形,基部圆形或近圆形并骤然收狭成明显的柄(即叶片与叶柄有截然的界限);总花梗常成簇抽出 8. 卵叶蜘蛛抱蛋 *A. typica* Baill.

1. 大花蜘蛛抱蛋

Aspidistra tonkinensis (Gagnep.) Wang et Lang, comb. nov. — *Colania tonkinensis* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 4: 190. 1934; et in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 787. f. 75, 8—12. 1934.

根状茎圆柱状,直径4—5毫米,密生鞘状鳞片,肉质纤维根单生于节上。叶单生,彼此相距2—3厘米,披针状矩圆形,长13.5—18厘米,宽4—5.5厘米,两侧不等宽,先端渐尖,基部骤然收狭成明显的柄,边缘或多或少波状;叶柄纤细,长10—15厘米。总花梗短,长3厘米,具5枚苞片;苞片卵形,不等大,上面的长5—12毫米,下面的较短;花被钟状,长3—3.5厘米,直径1.7—2厘米,5—6裂;花被筒长2厘米,增厚;裂片强烈覆瓦状排列,宽卵形或半圆形,膜质,长10—12毫米,具3条主脉;雄蕊5—6枚,着生于花被筒基部上方5毫米处;花药长3毫米,近盾状,肾形;柱头盾状膨大,圆形,直径11毫米,5—6裂,裂片圆形,向下反折。

产云南东南部(屏边)。生长在海拔1800米的林下。也分布于越南。

2. 九龙盘 竹叶盘(四川),青蛇莲、蛇莲、接骨丹、蜈蚣草(四川成都),盘龙七、走石马、寸八节、地蕨叶(四川重庆),赶山鞭(江西),蜈蚣草、地蜈蚣、赶山鞭(湖南),竹叶根(浙江)

Aspidistra lurida Ker-Gawl. in Bot. Reg. 8: 628. 1822. — *Macrogyne conval-*