

- 2. 九龙盘 *A. lurida* Ker-Gawl.
4. 花被裂片近三角形,内面无乳突,具4条特别肥厚、肉质、光滑、紫红色的脊状隆起;柱头裂片边缘向上反卷 3. 蜘蛛抱蛋 *A. elatior* Bl.
3. 花被裂片内侧具4条肉质的、裂成流苏状的脊状隆起 4. 流苏蜘蛛抱蛋 *A. fimbriata* Wang et Lang
1. 叶2—4枚簇生,带形或其它形状。
5. 叶带形,向基部渐狭而成不明显的柄(即叶片与叶柄无截然的界限);总花梗单生。
6. 花较小,坛状,长4.5—5毫米;花被裂片6枚或4枚,柱头直径1.5—2.5毫米,边缘有6枚或4枚圆齿 5. 小花蜘蛛抱蛋 *A. minutiflora* Stapf
6. 花较大,长15—22毫米。
7. 花钟状,花被裂片向外弯,内面有4条肉质脊状隆起;柱头上面沿裂缝有3(—4)条微凸的稜,3(—4)浅裂,裂片先端微缺,边缘向上反卷 6. 海南蜘蛛抱蛋 *A. hainanensis* Chun et How
7. 花坛状,花被裂片不向外弯,内面无肉质脊状隆起;柱头波状3浅裂,边缘不向上反卷 7. 丛生蜘蛛抱蛋 *A. caespitosa* P'ei
5. 叶卵状披针形或卵形,基部圆形或近圆形并骤然收狭成明显的柄(即叶片与叶柄有截然的界限);总花梗常成簇抽出 8. 卵叶蜘蛛抱蛋 *A. typica* Baill.

1. 大花蜘蛛抱蛋

Aspidistra tonkinensis (Gagnep.) Wang et Lang, comb. nov. — *Colania tonkinensis* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 4: 190. 1934; et in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 787. f. 75, 8—12. 1934.

根状茎圆柱状,直径4—5毫米,密生鞘状鳞片,肉质纤维根单生于节上。叶单生,彼此相距2—3厘米,披针状矩圆形,长13.5—18厘米,宽4—5.5厘米,两侧不等宽,先端渐尖,基部骤然收狭成明显的柄,边缘或多或少波状;叶柄纤细,长10—15厘米。总花梗短,长3厘米,具5枚苞片;苞片卵形,不等大,上面的长5—12毫米,下面的较短;花被钟状,长3—3.5厘米,直径1.7—2厘米,5—6裂;花被筒长2厘米,增厚;裂片强烈覆瓦状排列,宽卵形或半圆形,膜质,长10—12毫米,具3条主脉;雄蕊5—6枚,着生于花被筒基部上方5毫米处;花药长3毫米,近盾状,肾形;柱头盾状膨大,圆形,直径11毫米,5—6裂,裂片圆形,向下反折。

产云南东南部(屏边)。生长在海拔1800米的林下。也分布于越南。

2. 九龙盘 竹叶盘(四川),青蛇莲、蛇莲、接骨丹、蜈蚣草(四川成都),盘龙七、走石马、寸八节、地蕨叶(四川重庆),赶山鞭(江西),蜈蚣草、地蜈蚣、赶山鞭(湖南),竹叶根(浙江)

Aspidistra lurida Ker-Gawl. in Bot. Reg. 8: 628. 1822. — *Macrogyne conval-*

lariefolia Link et Otto, Ic. Pl. Select. t. 31. 1923. — *Aspidistra punctata* Lindl in Bot. Reg. 12: t. 977. 1826. — *A. kouy-tchensis* Lévl. et Vnt. in Lévl., Liliac. etc. Chine 35. 1905. — *A. kouy-tchensis* var. *aucubaemaculata* Lévl. et Vnt., ibid.

根状茎圆柱形,直径4—10毫米,具节和鳞片。叶单生,彼此相距0.5—3.5厘米,矩圆状披针形、近椭圆形、披针形、矩圆状倒披针形或带形,长13—46厘米,宽2.5—11厘米,先端渐尖,基部多数近楔形,少数近圆形,两面绿色,有时多少具黄白色斑点;叶柄明显,长10—30厘米。总花梗长2.5—5厘米;苞片3—6枚,其中1—3枚位于花基部,宽卵形,向上渐大,长7—9毫米,宽6.5—8毫米,先端钝或急尖,有时带褐紫色;花被近钟状,长8—15毫米,直径10—15毫米;花被筒长5—8毫米,内面褐紫色,上部6—8(—9)裂,裂片矩圆状三角形,长5—7毫米,基部宽2—4毫米,先端钝,向外扩展,内面淡橙绿色或带紫色,具2—4条不明显或明显的脊状隆起和多数小乳突;雄蕊6—8(—9)枚,生于花被筒基部,花丝不明显;花药卵形,长2毫米,宽1.5毫米;雌蕊长9毫米,高于雄蕊;子房基部膨大;花柱无关节;柱头盾状膨大,圆形,直径4—9毫米,中部微凸,上面通常有3—4条微凸的稜,边缘波状浅裂,裂片边缘不向上反卷。

产广东、福建、台湾、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州和广西。生于海拔600—1700米的山坡林下或沟旁。

根状茎民间药用,据说有活血祛瘀、接骨止痛之效。用来治跌打损伤、腰痛,产后虚弱、咳嗽及疟疾和蛇咬伤等。

本种叶的大小很不一致,形状变化也很大,叶基部从楔形可以到近圆形,在同一根状茎上的叶,形状变化也会很大的,有的有黄白色斑点,有的则无斑点;花被裂片有的是6枚,有的是8枚,极少数还出现9枚。从观察广东至四川的植物,花被裂片内面从无脊状隆起至具2—4条不甚明显以至明显的脊状隆起,并且在同一朵花上,脊状隆起有的显著些,有的则不甚明显。产于我国台湾省的 *A. attenuata* Hay., *A. dai-buensis* Hay. 和 *A. mushaensis* Hay. (Icon. Pl. Form. 9: 143—144. 1920),虽然我们未看到模式标本,但从原记载、图 and 原产地的标本看,仍属于本种变化幅度之内,很可能就是本种。

3. 蜘蛛抱蛋 图版 7: 8—9

Aspidistra elatior Bl. in Tijdschr. Nat. Gesch. Phys. 1: 76, t. 4. 1834; Yasuda, in Bot. Mag. Tokyo, 8: 75. t. 2. 1894; Lawrence, in Bailey 3: 190, fig. 62. 1955. — *Plectogyne variegata* Link in Otto et Dietr., Gartenz. 265. 1834. — *Aspidistra*