

lariefolia Link et Otto, Ic. Pl. Select. t. 31. 1923. — *Aspidistra punctata* Lindl in Bot. Reg. **12**: t. 977. 1826. — *A. kouy-tchensis* Lévl. et Vnt. in Lévl., Liliac. etc. Chine 35. 1905. — *A. kouy-tchensis* var. *aucubaemaculata* Lévl. et Vnt., ibid.

根状茎圆柱形,直径4—10毫米,具节和鳞片。叶单生,彼此相距0.5—3.5厘米,矩圆状披针形、近椭圆形、披针形、矩圆状倒披针形或带形,长13—46厘米,宽2.5—11厘米,先端渐尖,基部多数近楔形,少数近圆形,两面绿色,有时多少具黄白色斑点;叶柄明显,长10—30厘米。总花梗长2.5—5厘米;苞片3—6枚,其中1—3枚位于花基部,宽卵形,向上渐大,长7—9毫米,宽6.5—8毫米,先端钝或急尖,有时带褐紫色;花被近钟状,长8—15毫米,直径10—15毫米;花被筒长5—8毫米,内面褐紫色,上部6—8(—9)裂,裂片矩圆状三角形,长5—7毫米,基部宽2—4毫米,先端钝,向外扩展,内面淡橙绿色或带紫色,具2—4条不明显或明显的脊状隆起和多数小乳突;雄蕊6—8(—9)枚,生于花被筒基部,花丝不明显;花药卵形,长2毫米,宽1.5毫米;雌蕊长9毫米,高于雄蕊;子房基部膨大;花柱无关节;柱头盾状膨大,圆形,直径4—9毫米,中部微凸,上面通常有3—4条微凸的稜,边缘波状浅裂,裂片边缘不向上反卷。


产广东、福建、台湾、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州和广西。生于海拔600—1700米的山坡林下或沟旁。

根状茎民间药用,据说有活血祛瘀、接骨止痛之效。用来治跌打损伤、腰痛,产后虚弱、咳嗽及疟疾和蛇咬伤等。

本种叶的大小很不一致,形状变化也很大,叶基部从楔形可以到近圆形,在同一根状茎上的叶,形状变化也会很大的,有的有黄白色斑点,有的则无斑点;花被裂片有的是6枚,有的是8枚,极少数还出现9枚。从观察广东至四川的植物,花被裂片内面从无脊状隆起至具2—4条不甚明显以至明显的脊状隆起,并且在同一朵花上,脊状隆起有的显著些,有的则不甚明显。产于我国台湾省的 *A. attenuata* Hay., *A. dai-buensis* Hay. 和 *A. mushaensis* Hay. (Icon. Pl. Form. **9**: 143—144. 1920),虽然我们未看到模式标本,但从原记载、图和原产地的标本看,仍属于本种变化幅度之内,很可能就是本种。

3. 蜘蛛抱蛋 图版 7: 8—9

Aspidistra elatior Bl. in Tijdschr. Nat. Gesch. Phys. **1**: 76, t. 4. 1834; Yasuda, in Bot. Mag. Tokyo, **8**: 75. t. 2. 1894; Lawrence, in Bailey **3**: 190, fig. 62. 1955. — *Plectogyne variegata* Link in Otto et Dietr., Gartenz. 265. 1834. — *Aspidistra*



1—3.流苏蜘蛛抱蛋 *Aspidistra fimbriata* Wang et Lang, 1.植株; 2.花; 3.柱头。4—5.卵叶蜘蛛抱蛋 *A. typica* Baill., 4.花; 5.柱头。6—7.九龙盘 *A. lurida* Ker-Gawl., 6.花; 7.柱头。8—9.蜘蛛抱蛋 *A. elatior* Bl., 8.花; 9.柱头。(张泰利绘)

punctata Lindl. var. *albo-maculata* Hook. in Curtis's Bot. Mag. **89**: t. 5386. 1863.

根状茎近圆柱形,直径 5—10 毫米,具节和鳞片。叶单生,彼此相距 1—3 厘米,矩圆状披针形、披针形至近椭圆形,长 22—46 厘米,宽 8—11 厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘多少皱波状,两面绿色,有时稍具黄白色斑点或条纹;叶柄明显,粗壮,长 5—35 厘米。总花梗长 0.5—2 厘米;苞片 3—4 枚,其中 2 枚位于花的基部,宽卵形,长 7—10 毫米,宽约 9 毫米,淡绿色,有时有紫色细点;花被钟状,长 12—18 毫米,直径 10—15 毫米,外面带紫色或暗紫色,内面下部淡紫色或深紫色,上部(6—)8 裂;花被筒长 10—12 毫米;裂片近三角形,向外扩展或外弯,长 6—8 毫米,宽 3.5—4 毫米,先端钝,边缘和内侧的上部淡绿色,内面具 4 条特别肥厚的肉质脊状隆起,中间的 2 条细而长,两侧的 2 条粗而短,中部高达 1.5 毫米,紫红色;雄蕊(6—)8 枚,生于花被筒近基部,低于柱头;花丝短,花药椭圆形,长约 2 毫米;雌蕊高约 8 毫米,子房几不膨大;花柱无关节;柱头盾状膨大,圆形,直径 10—13 毫米,紫红色,上面具(3—)4 深裂,裂缝两边多少向上凸出,中心部分微凸,裂片先端微凹,边缘常向上反卷。

我国各地公园多有栽培。Lawrance (1955) 报道过他曾从日本采得野生的,并绘了图,他的植物确系本种,不知是否栽培后变为野生的。

4. 流苏蜘蛛抱蛋(新种) 图版 7: 1—3

Aspidistra fimbriata Wang et Lang, 植物分类学报 **16**: 1. 1978

根状茎直径 4—6 毫米,密生节和鳞片。叶单生,彼此相距 2—3 厘米或更近,矩圆状披针形,长 30—43 厘米,宽 3.5—6 厘米,两端渐狭,边缘有时具细锯齿;叶柄明显,坚硬,长 26—35 厘米,直径 2.5 毫米。总花梗短,长 0.3—1 厘米;苞片 4—5 枚,其中 2 枚位于花基部,近卵形,黄绿色,长 7 毫米,宽 5—8 毫米,先端急尖;花被钟形,长 13—15 毫米,具 8 或 10 裂;花被筒长 7—9 毫米,直径 10—15 毫米;裂片等大,卵状三角形,长 6—8 毫米,宽 3.5—5 毫米,先端急尖,张开,外面具紫色细点,内面有 4 条裂成流苏状的肉质的脊状隆起;雄蕊 8 或 10 枚,贴生于花被筒下部 $1/4$ 处,花丝不明显,花药宽卵形,长 1.8 毫米,宽 1.5 毫米,先端钝;雌蕊长 4 毫米;柱头盾状膨大,圆形,直径 7—10 毫米,紫色,中央明显凸出,4 裂,裂片先端凹缺,边缘反卷;花柱短;子房 4 室,每室有胚珠 4 枚。花期 11—12 月。

产福建和广东(海南岛)。生于海拔 280—500 米的山谷密林下的岩石上。北京植物园有栽培,从海南岛引种。

5. 小花蜘蛛抱蛋 图版 8: 5—6

Aspidistra minutiflora Stapf in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 113. 1903.