

枚位于花的基部,卵形,长5—7毫米,有紫色细点;花被坛状,长20—22毫米,直径16—20毫米,外面具紫色细点,内面暗紫色,上部6裂;花被筒长10—12毫米;裂片卵状披针形,长约10毫米,先端钝,不向外弯曲;雄蕊6枚,生于花被筒近基部,低于柱头;花丝很短;花柱无关节;子房短,3室,每室有胚珠3枚;柱头盾状膨大,直径10—12毫米,边缘波状3浅裂。浆果卵形,直径约6毫米,外面紫色,粗糙,每室有2颗形状不规则的种子。花果期3—4月。

产四川南部至西南部(北碚缙云山至峨眉山)。生于海拔500—1100米林下或竹林下。

8. 卵叶蜘蛛抱蛋 图版7: 4—5

Aspidistra typica Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris **2**: 1129. 1894; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. **122**: t. 7484. 1896; Gagnep. in Fl. Génér. Indo-Chine **6**: 785, fig. 75, 1—7. 1934.

根状茎较粗,近圆柱形,直径约7毫米,具节和鳞片。叶2—3枚簇生,卵圆状披针形至卵形,长18—32厘米,宽7—12厘米,先端渐尖,基部圆形或近圆形,具稀疏黄色斑点或无斑点;叶柄明显,坚硬,长12—21厘米。总花梗常成簇抽出,长2.5—4.6厘米,纤细,平卧或弯曲;苞片3—5枚,其中2枚位于花的基部,卵形,长约1厘米,先端钝或稍急尖,带紫褐色,有时有细点;花被坛状,直径10—18毫米,外面有紫色细点,内面深紫色,6浅裂;裂片卵形,较短,先端钝,不向外弯;雄蕊6枚,生于花被筒基部,低于柱头,几无花丝;子房短,花柱粗短,无关节;柱头大,圆形,呈盾状膨大,直径9—15毫米,边缘具6微缺。

产云南和广西(西南部)。也分布于越南北部。

19. 黄精族——Polygonateae


具根状茎;叶通常茎生,较少近基生;花单朵或几朵腋生,至排成顶生的总状花序或圆锥花序;花被片4或6,离生或合生成筒,在少数情况下具副花冠;雄蕊与花被片同数;花药基着或背着,内向或外向纵裂;子房3室;浆果。

约9属,我国产7属。

46. 七筋姑属——*Clintonia* Raf.

Raf. in Amer. Monthly Magaz. 266. 1818; et in Journ. Phys. **89**: 102. 1819.

多年生草本;根状茎短。叶基生,全缘。花葶直立;花通常几朵,排成顶生的总状



1—3.流苏蜘蛛抱蛋 *Aspidistra fimbriata* Wang et Lang, 1.植株; 2.花; 3.柱头。4—5.卵叶蜘蛛抱蛋 *A. typica* Baill., 4.花; 5.柱头。6—7.九龙盘 *A. lurida* Ker-Gawl., 6.花; 7.柱头。8—9.蜘蛛抱蛋 *A. elatior* Bl., 8.花; 9.柱头。(张泰利绘)