

—4 毫米,柱头 3 裂,向外弯卷,子房与花柱等长或稍短。浆果球形,直径约 1 厘米,黑色,有 2—3 颗种子。种子红褐色,直径约 4 毫米。花期 5—6 月,果期 7—10 月。

产黑龙江、吉林、辽宁。生林下或山坡草地,海拔 500—600 米。朝鲜、日本、苏联远东地区也有分布。

2. 山东万寿竹 儿百合(山东) 图版 15: 5

Disporum smilacina A. Gray in Perry, Jap. Exped. **2**: 321. 1854. — *D. smilacinum* A. Gray var. *album* Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. **29**: 215. 1884.

植株较矮小,具细短的根。茎高 15—35 厘米,通常不分枝。叶薄纸质,卵形至椭圆形,长 3—6 厘米,宽 1.5—3 厘米,先端渐尖,横脉不明显,边缘有乳头状突起,基部近圆形,常对折,有短柄。花白色,单朵生于茎顶端,有时为 2 花;花梗长 1—1.5 厘米;花被片稍张开,宽披针形,长 11—13 毫米,宽 2—4 毫米,脉纹明显,先端尖,基部略为囊状;花丝扁平,长 5—6 毫米,花药长 2—3 毫米;花柱连同 3 裂的柱头长 5—7 毫米,2 或 3 倍长于子房;雌雄蕊不伸出花被外。浆果球形,黑色,直径约 1 厘米。花期 4—5 月。


产山东(烟台)。生于海拔 400 米的林下。朝鲜和日本也有分布。

3. 长蕊万寿竹 图版 15: 1—2

Disporum bodinieri (Lévl. et Vnt.) Wang et Tang, 北研丛刊 **6**: 20. 1949, in nota. — *Tovaria bodinieri* Lévl. et Vnt. in Lévl., Liliac. etc. Chine **32**. 1905 — *T. longistyla* Lévl. et Vnt., ibid. — *T. esquirolii* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde **6**: 264. 1909. — *Disporum cavaleriei* Lévl., ibid.

根状茎横出,呈结节状,有残留的茎基和圆盘状疤痕;根肉质,长可达 30 厘米,粗 1—4 毫米,有纵皱纹或细毛,灰黄色。茎高 30—70 (—100) 厘米,上部有分枝。叶厚纸质,椭圆形、卵形至卵状披针形,长 5—15 厘米,宽 2—6 厘米,先端渐尖至尾状渐尖,下面脉上和边缘稍粗糙,基部近圆形;叶柄长 0.5—1 厘米。伞形花序有花 2—6 朵,生于茎和分枝顶端;花梗长 1.5—2.5 厘米,有乳头状突起;花被片白色或黄绿色,倒卵状披针形,长 10—19 毫米,先端尖,基部有长 1 (—2) 毫米的短距;花丝等长或稍长于花被片,花药长 3 毫米,露出于花被外;花柱连同 3 裂柱头 4—5 倍长于子房,明显高出花药之上。浆果直径 5—10 毫米,有 3—6 颗种子。种子珠形或三角状卵形,直径 3—4 毫米,棕色,有细皱纹。花期 3—5 月,果期 6—11 月。

产贵州、云南、四川、湖北、陕西(秦岭以南)、甘肃(南部)和西藏。生灌丛、竹林中或林下岩石上,海拔 400—800 米。根可供药用。



1—2.长蕊万寿竹 *Disporum bodinieri* (Lévl. et Vnt.) Wang et Tang, 1.植株的一部分;
2.花,已切除一枚花被片。3.万寿竹 *D. cantoniense* (Lour.) Merr., 植株的一部分。4.宝珠草 *D.*
viridescens (Maxim.) Nakai, 花,已切除一枚花被片。5.山东万寿竹 *D. smilacinum* A. Gray, 植株
的一部分。(王金凤绘)