

花柱长约为子房的6倍。浆果直径6—15毫米，具4—6颗种子。种子褐色，直径2—4毫米。花期5—7月，果期8—10月。

产四川、湖北、陕西(南部)和甘肃(南部)。生林下、林缘或草坡上，海拔1600—2500米。

6. 短蕊万寿竹 图版 16: 2

Disporum brachystemon Wang et Tang, 北研丛刊 **6**: 19. 1949. — *D. pulium* Salisb. var. *ovalifolium* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde **7**: 384. 1909.

根状茎短；根较细而质硬。茎高25—60厘米，不分枝或上部分枝。叶纸质或厚纸质，椭圆形至卵形，长2—5厘米，宽1—3厘米，先端急尖或有小尖头，基部圆形，下面脉上和边缘稍粗糙。伞形花序有花2—6朵，通常生于茎和分枝的顶端；花梗长1—2厘米，下弯，有稜和乳头状突起；花被片绿黄色，倒卵形或矩圆形，长7—13毫米，宽3—4毫米，有棕色腺点和微毛，先端尖或微凹，边缘有乳头状突起，基部具长0.5—1毫米的短距；雄蕊内藏，花药长3—4毫米，花丝短于或等长于花药；子房倒卵形，长约2.5毫米；花柱长3—5毫米，柱头3裂，扁平，有乳头状突起。浆果直径6—9毫米。种子褐色，直径2—3毫米。花期5—7月，果期8—10月。

产云南(西北部)、贵州(南部)和四川(西南部)。生灌丛中或林下，海拔2800—3000米。

7. 万寿竹 图版 15: 3

Disporum cantoniense (Lour.) Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 229. 1919; 侯宽昭, 广州植物志 677. 1956. — *Fritillaria cantoniense* Lour., Fl. Cochinch. 206. 1790. — *Uvularia chinensis* Ker-Gawl. in Curtis's Bot. Mag. **23**: t. 916. 1806. — *Disporum pullum* Salisb. in Trans. Hort. Soc. London **1**: 331. 1812. — *D. chinense* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 50. 1825. — *D. chinense* O. Kuntze, Rev. Gen. 708. 1891. — *D. kawakami* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**: 365. 1911. — *D. pullum* Salisb. var. *brunnea* C. H. Wright in Curtis's Bot. Mag. **145**: t. 8807. 1919. — *D. cantoniense* Merr. var. *brunneum* (C. H. Wright) Hand. -Mzt., Symb. Sin. **7**: 1207. 1936.

根状茎横出，质地硬，呈结节状；根粗长，肉质。茎高50—150厘米，直径约1厘米，上部有较多的叉状分枝。叶纸质，披针形至狭椭圆状披针形，长5—12厘米，宽1—5厘米，先端渐尖至长渐尖，基部近圆形，有明显的3—7脉，下面脉上和边缘有乳头状突起，叶柄短。伞形花序有花3—10朵，着生在与上部叶对生的短枝顶端；花梗



1. 大花万寿竹 *Disporum megalanthum* Wang et Tang, 植株。2. 距花万寿竹 *D. calcaratum* D. Don, 植株的一部分。3. 短蕊万寿竹 *D. brachystemon* Wang et Tang, 植株的一部分。4. 宝铎草 *D. sessile* D. Don, 植株的一部分。(冯晋庸绘)