

产四川(南部)、贵州(西南部)、湖南(西部和东北部)、广西、云南(东南部至中部)、广东(北部)、江西、浙江(南部)和台湾。生于海拔 500—2500 米的林下石山或荫蔽山谷水旁。

4. 竹根七 图版 28: 1—3

Disporopsis fuscipicta Hance in Journ. of Bot. **21**: 278. 1883.

根状茎连珠状, 粗 1—1.5 厘米。茎高 25—50 厘米。叶纸质, 卵形、椭圆形或矩圆状披针形, 长 4—9 (—15) 厘米, 宽 2.3—4.5 厘米, 先端渐尖, 基部钝、宽楔形或稍心形, 具柄, 两面无毛。花 1—2 朵生于叶腋, 白色, 内带紫色, 稍俯垂; 花梗长 7—14 毫米; 花被钟形, 长 15—22 毫米; 花被筒长约为花被的 2/5, 口部不缢缩, 裂片近矩圆形; 副花冠裂片膜质, 与花被裂片互生, 卵状披针形, 长约 5 毫米, 先端通常 2—3 齿或二浅裂; 花药长约 2 毫米, 背部以极短花丝着生于副花冠两个裂片之间的凹缺处; 雌蕊长 8—9 毫米; 花柱与子房近等长。浆果近球形, 直径 7—14 毫米, 具 2—8 颗种子。花期 4—5 月, 果期 11 月。

产广东(中部至北部)、广西、福建、江西(南部和西部)、湖南(西部)、四川(东南部)、贵州和云南。海拔 500—1200 (—2400) 米, 生于林下或山谷中。

20. 重楼族——Parideae


根状茎粗厚或细长而匍匐; 茎直立; 叶通常(3—) 4—20 枚排成一轮, 极少 2 枚对生, 有 3—5 主脉和网状细脉; 花单朵或多朵顶生, 后者排成伞形花序; 花被片离生, 4—20 枚, 排成 2 轮, 通常外轮叶状, 内轮花瓣状或条形至丝状, 较少内外轮相似; 雄蕊与花被片同数; 花药基着, 向两侧纵裂, 药隔有时在花药顶端突出; 子房一室而有侧膜胎座, 或 3 至多室而为中轴胎座; 胚珠多数; 花柱分离或部分合生; 果实为浆果或室背开裂的肉质蒴果。

共 4 属, 我国产 2 属。

53. 重楼属——Paris L.

L., Sp. Pl. ed. 1, 367. 1753.

多年生草本; 根状茎肉质, 圆柱状, 细长或粗厚, 生有环节。茎直立, 不分枝, 基部具 1—3 枚膜质鞘。叶通常 4 至多枚, 极少 3 枚, 轮生于茎顶部, 排成一轮, 具三主脉和网状细脉。花单生于叶轮中央; 花梗似为茎的延续; 花被片离生, 宿存, 排成二轮, 每轮(3—) 4—6 (—10) 枚; 外轮花被片通常叶状, 绿色, 极少花瓣状, 呈白色或沿脉具白



1—3. 竹根七 *Disporopsis fuscipicta* Hance. 1—2. 植株; 3. 花, 已剖开。4—5. 长叶竹根七 *D. longifolia* Craib. 植株的一部分; 5. 花, 已剖开。(张泰利绘)