

Stearn in Bull. Brit. Mus. Bot. **2**:79, f. 11, pl. 8. 1956.——*P. polyphylla* Sm. subsp. *marmorata* (Stearn) Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. 3, **10**:177. 1969.

多年生直立草本,高7—18厘米;根状茎粗短,直径达8毫米。叶(4—)5—6枚轮生,披针形或狭披针形,长5.5—6.5厘米,宽1.4—2.1厘米,上表面深绿色,沿脉具有白色斑纹,下表面紫褐色,近无柄。花梗长7—20毫米;外轮花被片3—4枚,狭披针形,长2—3厘米,宽5—10毫米,先端渐尖;内轮花被片条形,长1.7—2厘米,上部稍变宽;雄蕊6—8枚,花药长1.5毫米,药隔完全不突出于花药之上;子房近球形,绿色,长3毫米,宽3.5毫米,花柱粗短,上端3深裂。蒴果深紫色,开裂。

产四川(会理)、云南(西部)和西藏(东部)。生于海拔2800—3200米的高山上。丹也有分布。

5. 球药隔重楼

Paris fargesii Franch. in Journ. de Bot. **12**:190. 1898; 中国高等植物图鉴 **5**: 516, 图 7862. 1976. ——*P. petiolata* Baker var. *membranacea* C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 145. 1903.——*P. hookeri* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde **7**: 231. 1909.——*P. aprica* Lévl., ibid. **6**: 265. 1909.——*P. polyphylla* Sm. subsp. *fargesii* (Franch.) Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 3, **10**: 177. 1969.

植株高50—100厘米;根状茎直径粗达1—2厘米。叶(3—)4—6枚,宽卵圆形,长9—20厘米,宽4.5—14厘米,先端短尖,基部略呈心形;叶柄长2—4厘米。花梗长20—40厘米;外轮花被片通常5枚,极少(3—)4枚,卵状披针形,先端具长尾尖,基部变狭成短柄;内轮花被片通常长1—1.5厘米,少有长达3—4.5厘米(仅见于城口的模式);雄蕊8枚,花丝长约1—2毫米,花药短条形,稍长于花丝,药隔突出部分圆头状,肉质,长约1毫米,呈紫褐色。花期5月。

产江西、湖北、广东、四川和贵州。生于海拔550—2100米的林下或阴湿处。

具柄重楼(变种)

var. **petiolata** (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang, comb. nov.——*Paris petiolata* Baker ex C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 145. 1903; 裴鉴和周太炎, 中国药用植物志 **7**: 图 306. 1964.

本变种与原变种的区别在于叶为宽卵形,基部近圆形,极少为心形;内轮花被片长4.5—5.5厘米,雄蕊12枚,长1.2厘米,药隔突出部分为小尖头状,长约1—2毫米。花期6月。

产江西、广西、贵州和四川。生于海拔1300—1800米的林下荫处。