

产四川(南部)、云南(西北部)和贵州。生于 2000—3000 米的沟边阔叶林下。

分 变 种 检 索 表

1. 叶(8—)10—14(—22)枚,披针形、倒卵状披针形至披针形,基部楔形;无柄或具短柄;内轮花被片狭条形,通常远比外轮花被片长;子房通常暗紫色。
 2. 叶披针形至条形,幼果外面光滑……………**狭叶重楼**(变种) var. *stenophylla* Franch.
 2. 叶倒卵状披针形,幼果外面有疣状突起……………**宽叶重楼**(变种) var. *latifolia* Wang et Chang
1. 叶 5—9(—11)枚,矩圆形、矩圆状披针形或椭圆形,基部楔形、宽楔形或圆形;内轮花被片条形至狭条形 (Var. *apetala* 缺内轮花被片),短于或长于外轮花被片;子房绿色或紫色。
 3. 花梗通常短于叶;药隔突出部分长 1—3(—5) 毫米……………**短梗重楼**(变种) var. *appendiculata* Hara
 3. 花梗长于叶。
 4. 药隔长 1—2 毫米。
 5. 内轮花被片条形,宽约(2—)3—6 毫米,长为外轮的 1/2 至近等长……………**宽瓣重楼**(变种) var. *yunnanensis* (Franch.) Hand.-Mzt.
 5. 内轮花被片狭条形或中上部变宽。
 6. 内轮花被片通常短于外轮,很少与外轮近等长,有时上部宽约 1.5 毫米;花药长 1.2—1.5 (—2) 厘米,长为花丝的 3—4 倍……………**华重楼**(变种) var. *chinensis* (Franch.) Hara
 6. 内轮花被片长于或近等长于外轮;花药通常长 0.8—1.2 厘米,与花丝近等长或稍长于花丝……………**七叶一枝花** *P. polyphylla* Sm.
 4. 药隔长(3—)6—16 毫米。
 7. 具有内轮花被片,狭条形……………**长药隔重楼**(变种) var. *thibetica* (Franch.) Hara
 7. 缺内轮花被片……………**缺瓣重楼**(变种) var. *apetala* Hand.-Mzt.

7. 毛重楼

Paris pubescens (Hand.-Mzt.) Wang et Tang, comb. nov. — *P. polyphylla* Sm. var. *pubescens* Hand.-Mzt. in Sitzganz. Akad. Wiss. Wien. **62**: 145. 1925; 裴鉴和周太炎,中国药用植物志 **7**:图 304. 1964.

植株高可达 1 米,全株被有短柔毛;根状茎粗达 1—2 厘米。叶 5—10 枚,披针形、倒披针形或椭圆形,长 5—14 厘米,宽 1—2.5 厘米,先端渐尖,基部宽楔形或近圆形,叶背面有短柔毛,具短柄。内轮花被片长条形,与外轮的等长或超过,有时可以宽达 2 毫米;雄蕊长约 1—1.5 厘米,通常花丝稍短于花药,药隔突出部分长 1—1.5 毫米;子房通常为紫红色。花期 5—7 月,果期 8—9 月。

产四川(西南部)和云南(西北部)。生于海拔 2500—3300 米的高山草丛或林下。