

为硬刺,分枝上的距不明显。花每2朵腋生,绿黄色而稍带紫色;花梗长12—16毫米,关节位于近中部;雄花:花被长6—8毫米;花丝中部以下贴生于花被片上;雌花较小,花被长2.5—3.5毫米。浆果直径6—7毫米,熟时红色,有3—5颗种子。花期5月,果期7月。

产内蒙古(南部)、辽宁(西南部)、河北(西部至北部)和山西(中部至北部)。生于海拔2100米以下的山地、路旁、田边或荒地上。

本种分枝近基部一段形成强烈的弧曲,很容易区别于本属其他国产种类。

22. 南玉带 图版 39: 2—3

Asparagus oligoclonos Maxim. in Mém. Acad. Sci. Pétersb. Sav. Étrang. 9: 286. 1859; 刘慎谔等,东北植物检索表 572, 图版 215, 图 7. 1959.——*A. tamaboki* Yatabe in Bot. Mag. Tokyo 7: 61. 1956.


直立草本,高40—80厘米。根粗2—3毫米。茎平滑或稍具条纹,坚挺,上部不俯垂;分枝具条纹,稍坚挺,有时嫩枝疏生软骨质齿。叶状枝通常5—12枚成簇,近扁的圆柱形,略有钝稜,伸直或稍弧曲,长1—3厘米,粗约0.4—0.6毫米;鳞片状叶基部通常距不明显或有短距,极少具短刺。花每1—2朵腋生,黄绿色;花梗长1.5—2厘米,少有较短的,关节位于近中部或上部;雄花:花被长7—9毫米;花丝全长的3/4贴生于花被片上;雌花较小,花被长约3毫米。浆果直径8—10毫米。花期5月,果期6—7月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古(锡林浩特)、河北(东部)、山东(北部至东部)和河南(西部)。生于海拔较低的草原、林下或潮湿地上。也分布于朝鲜、日本和苏联远东地区。

23. 石刁柏(植物学大辞典) 露笋(广州) 图版 39: 1

Asparagus officinalis L., Sp. Pl. ed. 1, 313. 1753; 侯宽昭等,广州植物志 675, 图 355. 1956.——*A. officinalis* L. var. *atilis* L., l. c.——*A. polyphyllus* Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 30: 343. 1857.

直立草本,高可达1米。根粗2—3毫米。茎平滑,上部在后期常俯垂,分枝较柔弱。叶状枝每3—6枚成簇,近扁的圆柱形,略有钝稜,纤细,常稍弧曲,长5—30毫米,粗0.3—0.5毫米;鳞片状叶基部有刺状短距或近无距。花每1—4朵腋生,绿黄色;花梗长8—12(—14)毫米,关节位于上部或近中部;雄花:花被长5—6毫米;花丝中部以下贴生于花被片上;雌花较小,花被长约3毫米。浆果直径7—8毫米,熟时红色,有2—3颗种子。花期5—6月,果期9—10月。



1.石刁柏 *Asparagus officinalis* L., 雄株的一部分。2—3.南玉带 *A. oligoclonus* Maxim., 2.雌株的一部分; 3.雄株的一部分。4—5.曲枝天门冬 *A. trichophyllus* Bunge, 4.雄株的一部分; 5.雌花。(冯晋庸绘)