

3. 叶宽 (3—) 4—5 毫米; 花梗长 5—8 毫米; 无地下走茎.....

..... 4. 长梗山麦冬 *L. longipedicellata* Wang et Tang

2. 花药狭矩圆形或近矩圆状披针形, 长约 1.5—2 毫米, 几等长于花丝。

5. 具地下走茎; 叶宽 5—8 毫米; 花药狭矩圆形..... 5. 山麦冬 *L. spicata* (Thunb.) Lour.

5. 无地下走茎; 叶宽 8—22 毫米; 花药近矩圆状披针形

..... 6. 阔叶山麦冬 *L. platyphylla* Wang et Tang

1. 甘肃山麦冬 图版 40: 1—2

Liriope kansuensis (Batal.) C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 79.

1903. — *Ophiopogon kansuensis* Batal. in Acta Hort. Petrop. **13**: 103. 1893.

根较多而细; 根状茎很短, 具地下走茎。叶基生成丛, 长 15—25 厘米, 宽 1—1.5 毫米, 具 3 条脉, 边缘具疏锯齿且向背面卷, 基部无膜质的鞘。花葶长约 25 厘米; 总状花序长约 5.5 厘米, 具 10 几朵花; 花通常单生, 少数 2 朵簇生于苞片腋内; 苞片刚毛状, 干膜质, 最下面的长约 2.5 毫米; 花梗长 5—6 毫米, 关节位于近顶端; 花被片矩圆状披针形, 长约 5 毫米, 先端急尖, 淡紫色; 花丝细, 长约 2 毫米; 花药卵状椭圆形, 长约 1 毫米; 子房近球形; 花柱细, 长约 2.8 毫米, 柱头稍膨大, 微三裂。 花期 6 月。

产甘肃和四川(西北部)。生于溪边。

2. 矮小山麦冬 图版 41: 1—2

Liriope minor (Maxim.) Makino in Bot. Mag. Tokyo **7**: 323. 1893, et **15**: 93

1901. — *Ophiopogon spicatus* Ker-Gawl. var. *minor* Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb.

15: 85. 1871. — *Liriope graminifolia* Baker var. *minor* (Maxim.) Baker in Journ

Linn. Soc. Bot. **17**: 500. 1879. — *L. spicata* (Thunb.) Lour. var. *minor* (Maxim.)

C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 80. 1903. — *Ophiopogon fauriei* Lévl

et Vnt. in Rep. Sp. Nov. Fedde **5**: 283. 1908.

根细, 分枝较多, 有纺锤形的小块根; 根状茎不明显, 具细长的地下走茎。叶长 7—20 厘米, 宽 2—3(—4) 毫米, 先端急尖, 具 5 条脉, 近全缘, 基部常为具干膜质边缘的鞘所包裹。花葶短于叶, 长 6—7 厘米; 总状花序长 1—3 厘米, 具 5—10 几朵花, 花通常单生于苞片腋内, 少数 2—3 朵簇生; 苞片卵状披针形, 先端具短尖, 最下面的长约 4 毫米, 具膜质边缘; 花梗长 3—4 毫米, 关节位于近顶端; 花被片披针状矩圆形, 先端钝, 长 3.5—4 毫米, 淡紫色; 花丝圆柱形, 长约 1.5 毫米; 花药矩圆形, 长约 1.5 毫米; 子房近球形, 花柱稍粗短, 长约 2 毫米, 宽约 1 毫米; 柱头很短, 较花柱稍细。种子近球形, 直径 4—5 毫米, 成熟时暗蓝色。 花期 6—7 月。

产浙江、陕西、广西等地; 小块根也作麦冬用。也分布于日本。



1—2.甘肃山麦冬 *Liriope kansuensis* (Batal.) C. H. Wright, 1. 植株; 2. 花。3—4. 长梗山麦冬 *L. longipedicellata* Wang et Tang, 3. 植株; 4. 花。(吴彰桦绘)