

中部以下;花被片卵形,长约5毫米,蓝色;花丝稍明显;花药三角状卵形,长约2毫米;花柱细长,基部稍宽,几与花被片等长。花期6—7月,果期8—9月。

产四川南部(峨眉山、江安、巴县、南川一带)。常生于海拔1250—1800米的阔叶林下或阴湿处。

3. 云南沿阶草

Ophiopogon tienensis Wang et Tang, 静生汇报 7: 283. 1937.

根细而质软。茎匍匐于地面,直径2—4毫米,每隔几节生叶簇和根,叶簇基部有时粗厚。叶3—9枚簇生,披针形或矩圆状披针形,长7—15厘米,宽9—15毫米,先端渐尖或近急尖,基部渐狭成柄,上面绿色,具5—7条明显的脉,背面灰粉绿色具11条脉,叶柄长8—18厘米。总状花序生于茎和分枝先端的叶束中,长7—12厘米,具几朵至十几朵花;花单生于苞片腋内;苞片卵形或卵状披针形,膜质,长约3—4毫米;花梗长6—9毫米,关节位于中部以下;花被片卵形或卵状披针形,长8—9毫米,粉白色;花丝短,长仅1毫米;花药披针形,长6—7毫米;花柱细长,与花药近等长。种子椭圆形,长8—10毫米。花期5—6月,果期7—8月。

产云南东南部(开远、金平、文山一带)。生于海拔2200—2300米的林下。

4. 匍茎沿阶草(新种) 图版44: 3—4

Ophiopogon sarmentosus Wang et Dai, sp. nov.

根细长而质软,生于茎下部的每个叶簇下。茎细长,直径3—4毫米,匍匐,节上具紫褐色或深褐色膜质的鞘,每隔几节生叶。叶常5—6枚簇生,矩圆形或狭矩圆形,长5—10厘米,宽1.5—3厘米,先端近急尖或骤尖,基部不对称,渐狭成柄,上面绿色,具9条明显的脉,背面灰绿色,具多数细脉;叶柄长4—11厘米。总状花序生于茎先端的叶束中,长7—10厘米,具5—6朵花;花单生于苞片腋内;苞片披针形,先端渐狭成短尖,最下面的长7—10毫米,向上渐短;花梗长7—10毫米,关节位于中部以下;花被片外轮三片披针形,内轮三片卵形,长约8毫米,宽2—4毫米,淡紫色;花丝很短;花药三角状披针形,长约4毫米;花柱细长,开花后常等长或稍长于花被片。种子椭圆形,长约8毫米。花期8月,果期9—10月。

产云南西南部(临沧、景东、耿马一带)。生于海拔1700—2700米的林下。

5. 褐鞘沿阶草 图版44: 1—2

Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 268. 1892; Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 1218. 1936. — *Flueggea dracaenoides* Baker in Journ. of Bot. 12: 174. 1874. — *Mondo dracaenoides* Farw. in Amer. Midl. Nat. 7: 42. 1921.