

明显,长约1毫米,花药披针形,长4—6毫米,分离;花柱稍粗,长约7毫米。种子椭圆形,长约9毫米。花期6—7月,果期8—9月。

产云南(西北部至中部)和贵州(西部)。生于海拔1800—2800米的山坡杂木林下。

本种根较纤细而多,决不具粗壮的木质化的根;花大,花药分离;叶禾状而长,向先端渐狭,较易识别。

19. 西南沿阶草 图版 50: 3—4

Ophiopogon mairei Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde 9: 78. 1910.

根稍粗,柔软,多而长,近末端常有膨大成纺锤形的小块根。茎较短或中等长,每年稍延长,老茎上叶枯萎后残留叶鞘撕裂成的纤维,并生根,形如根状茎。叶丛生,近禾叶状或稍带剑形,长20—40厘米,宽7—14毫米,先端急尖或钝,基部具膜质的鞘,鞘常具横皱纹,上面绿色,背面粉绿色,通常具9条脉,边缘具细齿,基部逐渐收狭成不明显的柄。花葶较叶短很多,长10—15厘米,下部常被嫩叶所包;总状花序长5—7厘米,密生许多花;花1—2朵着生于苞片腋内;苞片钻形,最下面的长5—7毫米;花梗长4—5毫米或更短,关节位于中部或中部偏上;花被片卵形,长4—5毫米,白色或蓝色;花丝明显;花药卵形,长约2毫米;花柱稍粗短,长约2.5毫米。种子椭圆形或卵圆形,长约8毫米,蓝灰色。花期5月中旬至7月上旬。


产云南(东北部)、贵州、四川(东南部)、湖北(西南部)。生于海拔800—1800米的林下阴湿处。

本种与连药沿阶草外形近似,但后者花较大,花被片长6—7毫米,开放后常外卷,花药连合成短圆锥形而明显区别于本种。

20. 狹叶沿阶草 图版 50: 5—6

Ophiopogon stenophyllus (Merr.) Rodrig. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, sér. 2, 6: 95. 1934; et in Fl. Génér. Indo-Chine 6: 663. 1934.—*Peliosanthes stenophylla* Merr. in Philip. Journ. Sci. 13: 134. 1918.

根粗,木质,坚硬,密被白色根毛。茎较短或中等长,逐年延长后老茎上叶渐枯萎,残留叶鞘并生出新根,形如根状茎。叶丛生,禾叶状,草质,长25—60厘米,宽(4—)7—13毫米,先端渐尖,基部具灰白色膜质的鞘,上面深绿色,背面淡绿色,通常具9条明显的脉,边缘具细锯齿,叶柄不明显。花葶长10—32厘米,常短于叶,总状花序长4—14厘米,通常具10—40朵花,少有仅具几朵花;花1—2朵生于苞片腋内;苞片披针形,先端长渐尖,最下面的长8—15毫米;花梗长10—14毫米,关节位于中部或



1—2. 大沿阶草 *Ophiopogon grandis* W. W. Sm., 1. 植株; 2. 花。3—4. 西南沿阶草 *O. mairei* Lévl., 3. 花序; 4. 花。5—6. 狹叶沿阶草 *O. stenophyllum* (Merr.) Rodrig., 5. 花序; 6. 花。7—8. 连药沿阶草 *O. bockianus* Diels, 7. 花; 8. 果实, 示裸露的种子。9. 四川沿阶草 *O. szechuanensis* Wang et Tang, 花。(吴彭桦绘)