

其枯萎后撕裂成的纤维。花葶长 20—50 厘米,通常短于叶,有时等长于叶;总状花序长 2.5—7 厘米,具 15—20 余朵花;花常单生或 2—3 朵簇生于苞片腋内;苞片钻形或披针形,最下面的长可达 2 厘米,有的较短;花梗长 4—6 毫米,关节位于中部;花被片矩圆形,先端钝圆,长 4—7 毫米,白色或淡紫色;花丝极短;花药条状狭卵形,长 3—4 毫米;花柱细,长约 3.5 毫米。种子椭圆形。花期 5—8 月,果期 8—10 月。

产西藏、云南、四川、贵州、陕西(秦岭以南)、河南、湖北、湖南、安徽、广西、广东和台湾。生于海拔 1000—3000 米的山谷、林下阴湿处或水沟边。也分布于锡金、不丹、尼泊尔、印度、孟加拉、泰国、越南和斯里兰卡。

本种叶的宽窄、花的大小等特征变化较大,过去曾被一些学者分为不同的种,种下也划分成许多变种。我们比较了国产的大量标本,初步认为以归并成一种为宜,种下也不宜再细分。过去有人把国产的叶子较宽类型鉴定为 *O. wallichianus* (Kunth) Hook. f., 我们认为就是本种。

本种和沿阶草很相似,主要区别在于不具地下走茎,而且根状茎一般较粗大。

29. 广东沿阶草

***Ophiopogon reversus* Huang, 海南植物志 4:534. 1977.**

无走茎。茎很短。叶基生成丛,禾叶状,长 18—50 厘米,宽 5—10 毫米,先端急尖或钝,下部通常不具膜质的鞘,上面绿色,背面粉绿色,具 7—9 条脉,边缘稍粗糙或近于平滑。花葶较短于叶,长 20—25 厘米,总状花序长 2—6 厘米,具几朵至十几朵花;花一般单生,下部的常成对着生于苞片腋内;苞片钻形,下面的长达 1.3 厘米,向上部渐短;花梗长约 5 毫米,关节位于中部或中部以上;花被片披针形或狭披针形,长约 6 毫米,先端渐尖,长约 6 毫米,淡紫色带白绿色;花药条形,长 3.5—4 毫米;花柱基部稍宽阔,向上渐细,长几与花被片相等。种子球形或近椭圆形,直径 6—7 毫米。花期 9—10 月,果期 12—3 月。

产广东海南岛。生于海拔 750—1400 米的山坡疏密林下、山谷阴湿处、水旁等地方。

本种很近间型沿阶草(海南也有),主要区别在于本种花柱基部宽阔,花柱与子房之间没有明显界限,而间型沿阶草则花柱细长,基部不宽阔,似生于子房中央,在花柱与子房之间有明显的界限。

30. 阴生沿阶草 图版 55: 1—2

Ophiopogon umbraticola* Hance in Journ. of Bot. 6: 115. 1868.——*Flueggea japonica* Rich. var. *umbraticola* Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. 17:501.1879.——*Ophio-