

5. 簇花球子草 图版 56: 4—5

Peliosanthes teta Andr., Bot. Rep. t. 605. 1810; et in Curtis's Bot. Mag. 32: t. 1302. 1810. — *P. tonkinensis* Wang et Tang 静生汇报 7: 83. 1936. — *P. minor* Yamamoto, Contrib. Fl. Kainan. 1: 29. 1943; 中国高等植物图鉴 5: 530. 图 7890. 1976.

植株高达(20—)30—50厘米。茎短。叶4—8枚,披针形、条状披针形至椭圆形,长(12—)16—23厘米,宽2—4厘米,先端渐尖或短尖,具5条主脉,叶柄长(13—)20—30厘米,较少长5—8厘米。花葶长13—35厘米;总状花序长(5—)10—15厘米,每一苞片内簇生2—5朵花;苞片披针形,膜质,长3—7毫米;小苞片2—5枚,长约2毫米;花紫色,直径达6—8毫米,花被筒长2—3毫米,大部分与子房合生;裂片矩圆形或卵形,外轮稍长于筒部;花梗长(3—)5—8毫米,短于或长于苞片;花药长约0.5毫米,花丝合生的肉质环宽约0.5毫米,紫色,子房每室具2—4胚珠,花柱粗短,柱头三裂不明显。种子近圆形,长5—7毫米。花期1月。

产广东(海南岛)和广西(南部)。生于林下。

23. 粉条儿菜族——*Aletreae*

只1属,特征见属的记载。

60. 粉条儿菜属——*Alettris* L.


L., Sp. Pl. ed. 1. 319. 1753.

多年生草本;根状茎短,通常簇生细长的纤维根,较少根肉质。叶通常基生,成簇,带形、条形或条状披针形,无明显叶柄,中脉通常较粗。花葶从叶簇中抽出,较长,不分枝,通常中下部具几枚苞片状叶;总状花序延长或缩短;花小;花梗短或极短,从花梗基部至上端具2枚苞片;花被钟形或坛状,下部与子房合生,约从中部向上6裂,裂片镊合状排列;雄蕊6,着生于花被裂片的基部或花被筒上,花丝短,花药基着,半内向开裂,卵形或球形;子房由于部分与花被管合生而多少半下位,3室,每室有胚珠多数;花柱短或长,具3裂的柱头。蒴果卵形,倒卵形或圆锥形,无毛或有毛,包藏于宿存的花被内,室背开裂,具多数细小的种子。

约有15种,分布于亚洲东部和北美洲。我国产13种和1个变种,主要见于西南部。

分 种 检 索 表

1. 花被无毛。



1—2. 大盖球子草 *Peliosanthes macrostegia* Hance, 1. 植株; 2. 花, 已切除部分花被。3. 长苞球子草 *P. ophiopogonoides* Wang et Tang, 花序。4—5. 簇花球子草 *P. teta* Andr., 4. 花序; 5. 花的上面观。(张泰利绘)