

3100 米。

7. 星花粉条儿菜

Aletris stelliflora Hand.-Mzt., Symb. Sin. **7**: 1219, Abb. 33, Nr. 4. 1936.

——*A. gracilipes* Wang et Tang, 静生汇报 **1**: 107. 1943.

植株具细长的纤维根。叶簇生，纸质，条形，长 10—40 厘米，宽 3—5 (—8) 毫米，中部以上渐尖，先端钝，绿色，枯死叶鞘分裂成纤维状，褐棕色。花葶高 13—30 厘米，无毛，中下部具几枚长 0.8—3 厘米的苞片状叶；总状花序长 2.5—15 厘米，疏生多数花；苞片 2 枚，窄披针形，位于花梗的基部，长 2—4.5 毫米，短于花；花梗长 3—13 毫米；花被淡黄色，长 4.5—5 毫米，分裂到中部以下；裂片窄矩圆形，长 3 毫米，宽 0.8—1.4 毫米，反卷，膜质；雄蕊着生于花被裂片的基部，花丝下部贴生于裂片上，上部分离，长 1.5—1.7 毫米，花药椭圆形，长 0.6 毫米；子房卵形，长 2.5 毫米，宽 1.5 毫米，花柱长 1—1.5 毫米，蒴果卵形，长 4—5 毫米，宽 2—3 毫米。花期 7—9 月，果期 10 月。

产云南(西北部)和四川(天全一带)。生灌丛边、高山沼泽地、高山草地或竹林下，海拔 2500—3500 米。

8. 大花粉条儿菜 图版 59: 1—4

Aletris megalantha Wang et Tang, 植物分类学报 **1**: 119. 1951.

植株高大，具稍肉质的纤维根。叶纸质，最基部的苞片状，向上渐大而长，呈带状，至花葶上的又较小，呈宽条状披针形，长 15—38 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端急尖，有钟头，上部的苞片状，披针形，先端钝，长 2.5—11 厘米，宽 6—7 毫米，有缘毛。花葶高约 40 厘米，上部密生粘性的毛；总状花序长达 9 厘米，疏生多数花；苞片披针形，长 0.6—1.8 厘米，宽 3—3.5 毫米，先端钝，位于花梗的上端，长 7—13 毫米，略长于花，有缘毛；小苞片条形，有粘性的毛，包藏于苞片之内；花梗短，长 2—3 毫米，较粗，密生粘性毛；花被坛状，较大，外面密生粘性毛，内面无毛，长 9—10 毫米，宽 6—7 毫米，顶端 6 浅裂，裂片三角状卵圆形，长 2.5—2.8 毫米，宽 1.5 毫米，先端钝；雄蕊着生于花被筒上，花丝短，花药矩圆形，长于花丝；子房宽卵形，花柱长 2 毫米，柱头为不明显的 3 裂。花期 7 月。

产云南(镇康)。生草坡上，海拔 3400 米。

9. 粉条儿菜 金线吊白米(湖南) 图版 59: 5—7

Aletris spicata (Thunb.) Franch. in Journ. de Bot. **10**: 199. 1896. ——*A. japonica* Lamb. in Trans. Linn. Soc. **10**: 407. 1811, non Thunb. 1780, nec Hoult. 1779. ——*Hypoxis spicata* Thunb., Fl. Jap. 136. 1784.