

植株具多数须根,根毛局部膨大;膨大部分长 3—6 毫米,宽 0.5—0.7 毫米,白色。叶簇生,纸质,条形,有时下弯,长 10—25 厘米,宽 3—4 毫米,先端渐尖。花葶高 40—70 厘米,有稜,密生柔毛,中下部有几枚长 1.5—6.5 厘米的苞片状叶;总状花序长 6—30 厘米,疏生多花;苞片 2 枚,窄条形,位于花梗的基部,长 5—8 毫米,短于花;花梗极短,有毛;花被黄绿色,上端粉红色,外面有柔毛,长 6—7 毫米,分裂部分占 $1/3$ — $1/2$;裂片条状披针形,长 3—3.5 毫米,宽 0.8—1.2 毫米;雄蕊着生于花被裂片的基部,花丝短,花药椭圆形;子房卵形,花柱长 1.5 毫米。蒴果倒卵形或矩圆状倒卵形,有稜角,长 3—4 毫米,宽 2.5—3 毫米,密生柔毛。花期 4—5 月,果期 6—7 月。

产江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、河南、河北、山西、陕西(秦岭以南)和甘肃(南部)。生山坡上、路边、灌丛边或草地上,海拔 350—2500 米。日本也有分布。根药用,有润肺止咳、杀蛔虫、消痞积等效。

10. 狭瓣粉条儿菜 图版 59: 8—9

Aletris stenoloba Franch. in Journ. de Bot. **10**: 203. 1896.——*A. spicata* (Thunb.) Franch. var. *fargesii* Franch. ibid. 200.

植株具多数须根,少数根毛局部稍膨大;膨大部分长 3—6 毫米,宽约 0.5 毫米。叶簇生,条形,长 8—11 厘米,宽 3—4 毫米,先端渐尖,两面无毛。花葶高 30—80 厘米,有毛,中下部有几枚长 1—4 厘米、宽 1—1.5 毫米的苞片状叶;总状花序长 7—35 厘米,疏生多花;苞片 2 枚,披针形,位于花梗的上端,长 5—7 毫米,短于花;花梗极短;花被白色,长 6—7 毫米,有毛,分裂到中部或中部以下;裂片条状披针形,长 3.5—3.8 毫米,宽 0.5—0.8 毫米,开展,膜质;雄蕊着生于花被裂片的基部,花丝下部贴生于花被裂片上,上部分离,长约 1 毫米,花药球形,短于花丝;子房卵形,长 2.5—3 毫米。蒴果卵形,无稜角,有毛,长 3—5 毫米,宽 3—3.5 毫米。花果期 5—7 月。

产湖北、陕西(秦岭以南)、甘肃(南部)、四川、云南、贵州和广西。生在林边草坡上、山坡林下或路边,海拔 300—3300 米。

11. 短柄粉条儿菜 铁卵子(浙江) 图版 60: 1—3

Aletris scopulorum Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **38**: 370. 1908.

植株具球茎,有稍肉质的纤维根。叶不呈明显的莲座状簇生,纸质,条形,长 5—15 厘米,宽 2—4 毫米,先端急尖,基部狭而细。花葶高 10—30 厘米,纤细,有毛,中下部有几枚长 7—15 毫米的苞片状叶;总状花序长 4—11 厘米,疏生几朵花;苞片 2 枚,条状披针形,位于花梗的中部,长 3—5 毫米,短于花;花梗长 1—2.5(—3.5) 毫米,有毛;花被白色,长 3.5—4 毫米,有毛,分裂到中部;裂片条形,长 1.8—2 毫米,宽约



1—4. 大花粉条儿菜 *Aletris megalantha* Wang et Tang, 1. 植株的一部分; 2. 花; 3. 花, 已剖开; 4. 子房横切面。5—7. 粉条儿菜 *A. spicata* (Thunb.) Franch., 5. 植株; 6. 花, 已剖开; 7. 蒴果。8—9. 狭瓣粉条儿菜 *A. stenoloba* Franch., 8. 花, 已剖开; 9. 蒴果。(王金凤绘)