

光叶菝葜(变种)

var. **woodii** (Merr.) T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **13**: 15. 1960.
 ——*S. woodii* Merr. in Univ. Calif. Publ. Bot. **15**: 27. 1929. ——*S. amaurophlebia*
 Merr. in Lingn. Sci. Journ. **11**: 39. 1932. ——*S. balansaeana* H. Bon ex Gagnep. in Fl.
 Génér. Indo-Chine **6**: 760. 1934.

叶卵形至卵状椭圆形, 长4—7.5厘米, 基部浅心形、圆形至宽楔形, 边缘明显下卷, 上面光亮, 且网脉不很明显。

产广东海南岛。生于海拔500米以下的林中。也分布于马来西亚和印度尼西亚等地。

26. 粉背菝葜 图版 66: 1

Smilax hypoglauca Benth., Fl. Hongk. 369. 1861. ——*S. corbularia* Kunth var.
hypoglauca (Benth.) T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **13**: 15. 1960.

和筐条菝葜极相似, 但总花梗很短, 长1—5毫米, 通常不到叶柄长度的一半; 浆果直径8—10毫米。花期7—8月, 果期12月。

产江西(南部)、福建(中部至南部)、广东(除雷州半岛和海南岛以外的地区)和贵州(南部)。生于海拔1300米以下的疏林中或灌丛边缘。

27. 菱叶菝葜 图版 67: 4


Smilax hayatae T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **10**: 15, t. 2. 1957, et **13**: 21. 1960. ——*S. gracillima* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**: 359. 1911, et Icon. Pl. Form. **9**: 131, f. 45, 2—3. 1920, non Lévl.

小灌木, 披散或多少攀援, 无刺。叶革质, 卵状菱形, 长3—5(—7)厘米, 宽1—2.5(—4.5)厘米, 先端渐尖, 基部楔形至宽楔形, 下面苍白色; 叶柄长2—5(—8)毫米, 脱落点位于近顶端, 无卷须, 基部具鞘, 鞘延伸成一对耳, 耳三角状披针形, 长约为叶柄全长的 $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$, 宽1—3毫米。伞形花序具2—7朵花; 总花梗纤细, 长7—17(—22)毫米; 雄花很小, 外花被片长1.8—2毫米, 宽0.5—0.8毫米, 内花被片宽约为外花被片的一半; 雄蕊长约为花被片的一半, 花药近圆形。浆果直径约8毫米, 熟时红色。花期4月, 果期12月。

产台湾(北部)和广东(北部)。生于海拔900—1500米的林下、山谷和涧边。

28. 弯梗菝葜 图版 67: 1

Smilax aberrans Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **81**: 71. 1934, Jan.-Feb., et in Fl. Génér. Indo-Chine **6**: 759. 1934. ——*S. Tsaii* Wang, 静生汇报 **5**: 117. 1934. Sept.



1. 弯梗菝葜 *Smilax aberrans* Gagnep., 果枝。2—3. 苍白菝葜 *S. aberrans* Gagnep. var. *retroflexa* Wang et Tang, 2. 雌株的花枝; 3. 雌花。4. 菱叶菝葜 *S. hayatae* T. Koyama, 叶。(刘春荣绘)