

T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **13**: 33. 1960.

攀援灌木。茎长 1—5 米，枝条平滑或稍粗糙，无刺。叶纸质或薄革质，通常卵形、矩圆状卵形或三角状披针形，长 3.5—9 厘米，宽 1—5 厘米，先端急尖并具尖凸，基部钝或浅心形，干后一般暗绿色，下面苍白色；叶柄长 0.5—1.5 (—2) 厘米，约占全长的  $1/2$ — $2/3$  具狭鞘，脱落点位于近顶端，一般有卷须。伞形花序具几朵或更多的花；总花梗多少扁平，宽 0.5—1 毫米，一般短于叶柄；花序托膨大，连同多枚宿存的小苞片多少呈莲座状；花淡绿色或红色；雄花外花被片长 2—2.5 毫米，宽约 1 毫米，内花被片稍狭而短；雌花与雄花大小相似，具 6 枚退化雄蕊。浆果直径 5—7 毫米，熟时蓝黑色。花期 5—6 月，果期 12 月。

产四川(西南部)、贵州(西南部)、云南和西藏(波密地区)。生于海拔 1000—3000 米的林下、灌丛中或山谷沟边。

地下部分在云南作草药用，称红草薺，用来祛风除湿，利水消炎。

### 31. 小叶菝葜

**Smilax microphylla** C.H. Wright in Kew Bull. 117. 1895. — *S. microphylla* C. H. Wright var. *angustifolia* Warb. in Bot. Jahrb. **29**: 259. 1900. — *S. gracillima* Lévl. et Vnt. in Lévl., Liliac. etc. Chine 26. 1905. — *S. labordei* Lévl. et Vnt., ibid. 27. — *S. castaneiflora* Lévl. in Bull. Géogr. Bot. **25**: 39. 1915.

和上种相似。但枝条多少具刺；叶革质，披针形、卵状披针形或近条状披针形；总花梗稍扁或近圆柱形，宽约 0.5 毫米，常稍粗糙，明显短于叶柄；花淡绿色；雌花比雄花稍小，具 3 枚退化雄蕊。花期 6—8 月，果期 10—11 月。

产甘肃(南部)、陕西(秦岭以南)、四川、湖北(西部)、湖南、贵州和云南(东北部)。生于海拔 500—1600 米的林下、灌丛中或山坡阴处。

### 32. 土茯苓(本草纲目) 光叶菝葜(广州植物志) 图版 69

**Smilax glabra** Roxb., Fl. Ind. ed. 2, **3**: 792. 1832; 侯宽昭等, 广州植物志 685. 1956; 中药志 **1**: 35, 彩图 2. 1959. — *S. hookeri* Kunth, Enum. Pl. **5**: 162. 1850. — *S. trigona* Warb. in Bot. Jahrb. **29**: 258. 1900. — *S. calophylla* Wall. var. *concolor* C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 96. 1903. — *S. glabra* Roxb. var. *maculata* Bodinier ex Lévl., Liliac. etc. Chine 23. 1905, non Roxb. — *S. dunniana* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde **9**: 446. 1911. — *S. blinii* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou 256. 1914.

攀援灌木；根状茎粗厚，块状，常由匍匐茎相连接，粗 2—5 厘米。茎长 1—4 米，