

产湖北(西部)、湖南(西部)、广西(西南部)、四川(中部至南部)、贵州和云南(东南部)。生于海拔 600—1500 米的林下、灌丛中或山坡荫蔽处。也分布于越南北部。

41. 梵净山菝葜

Smilax vanchingshanensis (Wang et Tang) Wang et Tang, stat. nov. —— *S. laevis* Wall. ex A. DC. var. *vanchingshanensis* Wang et Tang, 中研丛刊 **5**: 424. 1934.

攀援灌木。茎长可达 5 米,枝条具纵条纹,无刺或具疏刺。叶革质,卵状矩圆形、狭卵形至近披针形,长 8—16 厘米,宽 4—9 厘米,先端渐尖至短骤凸,基部近截形或浅心形,表面稍有光泽;叶柄长 1—2 厘米,约占全长的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$ 具狭鞘,有卷须,脱落点位于近中部。伞形花序 1—2 个生于叶腋,具多数花;总花梗稍长于叶柄,近基部有关节,着生点上方有一枚与叶柄相对的鳞片(先出叶);花序托膨大,近球形,在果期直径约 3 毫米;花黄绿色;雄花外花被片长 7—8 毫米,宽约 1.6 毫米;内花被片宽约为外花被片的一半;雄蕊花丝基部约 1 毫米合生成柱,占雄蕊全长 $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{8}$;雌花比雄花小一半,具 6 枚退化雄蕊。浆果直径 9 毫米。花期 9—10 月,果期 12 月至次年 1—2 月。

产湖北(西南部)、四川(峨眉山至金佛山一带)和贵州(北部)。生于海拔 400—1400 米的疏林中、林缘或山坡草丛中。

42. 束丝菝葜 图版 72: 1

Smilax hemsleyana Craib in Kew Bull. 409. 1912; Gagnep. in Fl. Génér. Indo-Chine **6**: 772. 1934 —— *S. zeylanica* L. ssp. *hemsleyana* (Craib) T. Koyama in Fl. Thail. **2**: 218, f. 29. 1975 —— *S. indica* auct. non Vitm.: Norton in Pl. Wils. **3**: 12. 1916.

攀援灌木。茎长 3—5 米,有时可达 15 米,无刺或疏生刺。叶革质,卵状椭圆形至椭圆形,长 7—13 厘米,宽 4—11 厘米,先端微凸或短渐尖,基部近圆形,叶脉在两面浮凸;叶柄长 1.5—2.5 厘米,约占全长的 $\frac{1}{4}$ 具狭鞘,一般有卷须,脱落点位于近中部。伞形花序通常单生于叶腋,具几朵或多数花,较少 2 个伞形花序生于一个共同的总花梗上;总花梗长 1.5—4.5 厘米,下部具关节和一枚披针形苞片,着生点上方有一枚与叶柄相对的鳞片(先出叶);花序托膨大,矩圆形,在果期长 3—6 毫米,宽 2—4.5 毫米;雄花外花被片披针形,长约 5 毫米,宽约 1 毫米,内花被片约一半宽;雄蕊基部约占全长 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ 的花丝合生成柱;雌花比雄花小一半,具 3 枚丝状退化雄蕊。浆果直径约 7 毫米。花期 4—5 月,果期 11 月。