

产贵州(南部)和云南(中部至南部)。生于海拔 630—1700 米的林下、灌丛中或山坡草丛中。也分布于泰国。

43. 缘毛菝葜 图版 72: 3

Smilax kwangsiensis Wang et Tang, 中研丛刊 5: 425. 1934.

攀援灌木。茎长约 3 米,枝条无刺或疏生刺。叶纸质,卵状披针形或椭圆状披针形,长 8—18 厘米,宽 3.5—5.5 厘米,先端渐尖,基部圆形或楔形;叶柄长 1.5—2.5 厘米,约占全长的 1/3—1/4 具狭鞘,无毛或稍具小刚毛,有卷须,脱落点位于近中部或上部;鞘的边缘具缘毛或呈细流苏状。伞形花序单生于叶腋;总花梗在果期明显长于叶柄,近基部有关节,着生点上方有一枚与叶柄相对的鳞片(先出叶)。浆果直径约 1.2 厘米。 果期 10—11 月。

产广西(南宁至十万大山一带)。生于海拔 300—400 米的林下。

小刚毛菝葜(新变种)

var. *setulosa* Wang et Tang, var. nov.

茎和枝条多少粗糙,有时具小刚毛;叶柄密生小刚毛;雄花黄绿色;外花被片长约 8 毫米,宽约 1.2 毫米,内花被片约一半宽;雄蕊离生,花药条形。 花期 8 月。

产广东西部(信宜)。生于林下。

44. 大果菝葜 图版 75: 1


Smilax macrocarpa Bl., Enum. Pl. Jav. 1: 19. 1827-28; A. DC., Monogr. Phaner. 1: 184. 1878.——*S. megacarpa* A. DC., ibid. 186.

攀援灌木。茎长可达 10 米,枝条通常无刺,小枝多少具细条纹。叶纸质,干后有时变淡黑色,卵形或椭圆形,长(5—)10—20 厘米,宽 3—12 厘米,先端近微凸,基部圆形至截形,上面稍有光泽,下面淡绿色;叶柄长 1.5—5 厘米,约占全长的 1/3—1/2 具狭鞘,一般有卷须,脱落点位于上部。圆锥花序长 3—6(—10)厘米,着生点上方有一枚与叶柄相对的鳞片(先出叶),通常具 2 个伞形花序,较少具 3 个或仅单个的;伞形花序总花梗长 1.5—3.5 厘米;花序托稍膨大;雄花绿黄色;外花被片长 6—7 毫米,宽约 1.5 毫米,内花被片宽约 0.6 毫米。浆果直径 1.2—2 厘米,熟时深红色。 花期 10—12 月,果期 5—6 月。

产广东、广西和云南(南部至东南部)。生于海拔 1500 米以下的林中、灌丛下或山坡荫蔽处。也分布于越南、老挝、马来西亚和印度尼西亚。

45. 圆锥菝葜 图版 73

Smilax bracteata Presl, Reliq. Haenk. 1: 131. 1830.——*S. stenopetala* A. Gray in



1—2. 大果菝葜 *Smilax macrocarpa* Bl., 1. 果枝; 2. 叶。3. 抱茎菝葜 *S. ocreata* A. DC., 叶。
4—5. 马钱叶菝葜 *S. lunglingensis* Wang et Tang, 4. 雄株的花枝; 5. 叶。6. 圆叶菝葜 *S. bauhinioides*
Kunth, 一段小枝。(冯晋庸绘)